

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА при СНК РСФСР

М.И. АДО

ЭКОЛОГИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

МОСКВА

1934

М. И. АДО

Э К З О Т Ы
ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

Д Л Я О З Е Л Е Н Е Н И Я
Т Е Р Р И Т О Р И И К У Р О Р Т О В
С О Ч И, М А Ц Е С Т И Н С К О Г О
Р А Й О Н А

ВВЕДЕНИЕ

Сочи-мацестинский район является одной из основных жемчужин нашего Союза, находящейся на Черноморском побережье Кавказа к югу от г. Туапсе до границы Абхазии.

Этот район имеет в настоящее время всесоюзное значение, а по лечебным свойствам серо-водородных мацестинских вод не имеет себе равного в международном масштабе.

Наше правительство, уделяя совершенно справедливо особое внимание развитию Сочи-мацестинского курорта, считая его «всесоюзной здравницей», ставит в порядок дня также и развитие всего хозяйства субтропической курортной зоны РСФСР.

До революции хозяйство Сочи-мацестинского района имело резко выраженный во всех областях экстенсивный характер. В настоящее время в области сельского и лесного хозяйства район приобретает совершенно иной облик: исчезла из культуры кукуруза и заменилась ценнейшей культурой табака; произведены большие посадки персиков, мандарин, сливы и др. Лесные массивы, занимая громадные горные пространства, теперь начинают постепенно использоваться. Проводится сеть дорог, используются реки как лесной транспорт, и недалеко то время, когда будет установлено интенсивное лесное хозяйство. Климат Сочинского района, являющегося северной границей так называемых влажных субтропиков, дает в руки местных лесоводов и инженеров зеленого строительства громадные возможности для введения новых ценных древесных пород иноземного происхождения. Местная дендрофлора занимает довольно часто большие площади не по праву и должна в конечном счете уступить место более требовательным к климату, но в месте с тем и более ценным древесным породам.

Набор таких растений как для лесокультурного дела, так и для озеленения курортной зоны Черноморского побережья Кавказа до настоящего времени не был поставлен на правильные рельсы. Метод изучения климатических аналогов для подбора экзотов безусловно верен, но практическое введение этих экзотов в больших масштабах без предварительных опытов рискованно. Натурализация экзотов на Черноморском побережье Кавказа в некоторых местах имеет 50-летнюю давность (Сухум, Батум), поэтому опыт натурализации прежних лет должен быть широко использован для введения экзотов на Черноморском побережье в целом и в частности в работе Сочи-мацестинского курорта. В течение 1928—1929 гг. мною было

проделано предварительное обследование всего района с учетом не только больших натурализационных пунктов, вроде дендрария техссккультуры (бывш. Худековский парк) или парка совхоза «Южная культура» близ Адлера, но и всех мелких участков и садов, где имелось то или иное количество экзотов. Каждое растение, найденное в том или ином месте, заносилось в соответствующую карточку с характеристикой отдельных экземпляров, с указанием возраста, высоты, диаметра и общего состояния дерева и точного местонахождения (рельеф, высота над уровнем моря, окружение и т. д.)

Автор

НАТУРАЛИЗАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ СОЧИНСКОГО РАЙОНА

(см. карту на стр. 26)

№ 1. Совхоз Вардене — находится в 4 км от ст. Лоо в сторону Туапсе и является крайней северо-западной точкой «влажных субтропиков» Черноморского побережья. Это бывшее имение «великих» князей из Романовых. Там имеется небольшой декоративный сад, который, к сожалению, в настоящее время имеет очень жалкий вид, и сохранившаяся древесная растительность насчитывает очень немного видов (до 45). По рассказам местных старожилов-садовников (А. К. Новиков, Гейне), там имелось до 1917 г. большое разнообразие; в частности росли прекрасные камелии, гардении, гортензии и т. д., которые сейчас совершенно исчезли, так как за время гражданской войны отступающие казаки безжалостно рубили на дрова тюльпанные деревья, криптомерии и другие ценные экзоты. В настоящее время там образован совхоз, но о восстановлении декоративного сада не думают, хотя имеющиеся остатки экзотов сохраняются. Территория с садом находится за прикрытием мыса, отчего норд-ост, свирепствующий в Новороссийске и отчасти около Туапсе, здесь мало заметен.

№ 2. Дача бывш. Аристова, принадлежащая теперь табачному колхозу им. 26 бакинских коммунаров, имеет около 3 га парка, который расположен в 4 км от моря в долине речки Лоо и защищен со всех сторон горами. Почва глинистая с примесью аллювия, рельеф волнистый, вследствие чего никогда не бывает заболачивания. Посадки парка производились в период 1901—1905 гг., древесная растительность хорошо сохранилась, несмотря на довольно запущенный наружный вид парка. Колхозники очень внимательно относятся к парку и берегут редкие породы. Отдаленность от курортных населенных мест избавляет парк от непрошеных охотников за экзотическими диковинками (шишки хвойных, пишни, магнолии и др.). Это единственное место в Сочинском районе, где можно достать семена и шишки *Pinus Coulteri*, *Pinus Sabiniana* и семена *Ginkgo biloba*.

В парке имеется 58 древесных видов (не считая разновидностей), из которых роскошно развиваются следующие:

1. *Ginkgo biloba* (Н — 18 м, Д — 51 см).
2. *Sequoia gigantea* (Н — 22 м, Д — 75 см).

3. *Sequoia sempervirens* (Н — 26 м, Д — 74 см).

4. *Pinus Coulteri* — нормально развивающееся дерево, хорошо плодоносящее, единственно хороший экземпляр во всем Сочинском районе.

5. *Liriodendron tulipifera* — 4 хороших, плодоносящих экземпляра.

6. *Sterculia platanifolia* — роскошные экземпляры (3).

7. *Sciadophytis verticillata* — редкое растение.

8. *Sophora glauca* — одно из двух имеющихся в районе деревьев.

9. *Abies Pinsapo* (Н — 15 м, Д — 50 см).

10. *Picea Morinda* — 5 прекрасных экземпляров.

Так как кругом парка земли обрабатываются, то засорение его дикими породами (самосевом) затруднено, вследствие чего некоторые экзоты заполонили парк своим самосевом, образовав густые заросли, например *Hibiscus syriacus* и *Cupressus lusitanica*.

Одним словом, это один из интереснейших натурализационных пунктов Сочинского района, расположенный к тому же на границе субтропической зоны.

Необходимо местным работникам принять все меры к использованию семенного и вегетативного материала, в большом количестве имеющегося в этом парке¹.

№ 3. Участок (дача) б. Шереметьева, поселок Лоо (теперь в здании помещаются различные учреждения сельсовета и квартиры служащих). Около здания имеется парк, площадью около 3 га, страшно запущенный, заросший дикой порослью, и лишь около самого здания сохранился небольшой участок, где еще поддерживается жителями относительный порядок и чистота.

Весь парковый участок расположен на расстоянии 1 км от ст. Лоо в сторону Сочи, на южном крутом склоне, с небольшими ровными площадками в прибрежной полосе, причем главная аллея парка (у кипарисов) начинается от самой линии железной дороги и поднимается по спирали к зданию.

Основные посадки в парке производились в 1904—1907 гг. и продолжались до 1914 г. С 1915 г. по настоящее время никакого ухода в нем не было и по всей вероятности много пород исчезло, но сохранившиеся в нем 32 вида экзотов дают нам прекраснейший материал по учету степени натурализации, так как, находясь в исключительно неблагоприятных условиях, некоторые из них проявили удивительную живучесть и способность бороться с местными породами. Так например *Hibiscus syriacus*, так же как и в пункте № 2, образует большие заросли, *Melia Azedarach* обсеменила довольно большой участок вокруг себя и мне удалось найти 10-летние

¹ О сборе исходного материала размножения в Сочинском районе будет отдельная работа.

самосевы, имеющие уже вид взрослого дерева. Колоссальные заросли айланта (*Ailanthus glandulosa*) несмотря на ежегодную вырубку дают поросль и с каждым годом захватывают себе новую территорию. На этом участке имеются также большие заросли *Asasia dealbata*, ежегодно почти обмерзающие, но прекрасно возобновляющиеся от поросли и корневых отпрысков, проявляя удивительную живучесть; это ее крайняя северная точка распространения в районе.

Прекрасная лиана *Passiflora coerulea* дала вокруг себя массу самосева и корневых отпрысков.

Нельзя не упомянуть о прекрасном экземпляре *Cunninghamia sinensis* (Н—16 м, Д—56 см), *Cedrus Libani* (Н—25 м, Д—68 см), *Camellia japonica* (Н—3 м), *Cupressus lusitanica, glauca*, *Sequoja gigantea* (Н—12 м, Д—48 см), а также редко встречающийся в районе *Cellitris australis* (на горке).

№ 4. Участок (дача) б. Крестовникова — находится рядом с участком б. Шереметьева (№ 3), в сторону Сочи, на таком же крутом южном склоне, занимая площадь около 2 га.

На границе с железнодорожной линией тянется живая изгородь из маклюры, ежегодно и обильно плодоносящая, так как эта изгородь уже лет 14 не подрезалась. Осенью из вагона поезда можно видеть большие желтые соплодия, в большом количестве висющие на почти голых деревьях и издали удивительно напоминающие апельсины. Так как плоды эти несъедобны, а для разведения в питомниках собирать их местные содоводы еще не раскачались, то эти желтые плоды — шары маклюры — опадают на землю, гниют и с весны дают обильный самосев, что говорит за хорошее качество семян. Далеко от материнского дерева самосев не распространяется, так как за изгородью маклюры тянутся обработанные с.-х. участки и самосев ежегодно уничтожается. От изгороди к дому, расположенному на склоне на высоте 50 м над уровнем моря, проделана въездная дорога, идущая спирально по склону, так же как и на участке 3. В нижней части она обсажена калифорнийскими соснами (*Pinus insignis*), имеющими гигантский рост (Н—25 м, Д—100 см). Возраст их около 25—30 лет, но в 1932 г. 50% из них уже погибло. Так как это крайняя северная точка, где мною найдены эти сосны, то действительное обследование причин гибели их с точки зрения учета степени их натурализации представляет большой интерес, о чем мы и остановимся более подробно в работе о «соснах Сочинского района».

Парк, разбитый перед домом, имеет в настоящее время 48 видов, из которых наиболее интересны следующие: 1. *Rhus vernicifera* — лаковое дерево — 2 экз., редко встречающееся в районе, в возрасте 18—20 лет, плодоносит. 2. *Dasylium glaucophyllum* — дазилирум голубой — хороший экземпляр — редко попадается в культуре. 3. *Ceanothus azureus* — цеанотус — хороший декоративный кустарник, лучший экземпляр в районе.

Кроме того интересно отметить маленькую рощу из криптомерий (2-летних) и пирамидального кипариса, образовавшуюся из заброшенного питомника.

№ 5. Участок (дача) б. Павлова — очень интересный участок, хорошо сохранившийся и представляющий громадный интерес для учета степени натурализации экзотов на побережье. В настоящее время на этом участке помещается санатория и парк содержится в большом порядке. Этот участок, площадью в 4 с лишним га, находится в поселке Уч-дере, примерно в 12 км от Сочи, на высоте 100 м над уровнем моря, на южном пологом (в том месте) склоне, хорошо увлажняемом, с питательной суглинистой почвой. Буйный рост всей растительности говорит за хорошие качества и местоположение участка.

Всего в парке мною найдено 62 вида (с 92 разновидностями) древесных растений и почти все они в том или ином отношении представляют большой интерес и по редкости видов, и по роскошному росту, и по плодоношению, и способам применявшегося к ним ухода и т. д. Громадные до 8—10 м высоты и 10 см в диаметре стволы японских бамбуков (*Mooso*, *Madake*, *Mitis*), приводят в восхищение всех, для нас же интересны они тем, что это самая северная их точка распространения на побережье. Имеются действительно гигантские секвой (H—25—26 м, Д—75 см и больше), гигантские туи, роща тюльпановых деревьев (единственная на побережье) в 20-летнем возрасте, хорошо плодоносящая, с обильным самосевом вокруг, роща из 100 шт. калифорнийской сосны (*Pinus insignis*) в 18-летнем возрасте, роща секвой — 60 шт. в 16-летнем возрасте, аризонский кипарис, калифорнийский платан (*Platanus Californica*), прекрасные экземпляры юношеских форм кипарисовика (из бывшей секции *Retinospora*) и много других. Собранный там богатейший материал хотя и не уничтожается, но все же не используется для целей размножения. Это прекрасный маточник экзотов!

№ 6. Участок (дача) б. Шипова — расположен несколько ниже по тому же склону, как и пункт 5, и является его естественным продолжением. Парк, около 4½—5 га, на южном склоне в 1929/30 г. находился в довольно жалком состоянии, так как арендовавший этот участок частник никакого ухода за ним не делал. По всему парку паслись козы и коровы, ценные растения безжалостно обрывались проходившими курортными больными и, повидимому, к 1932 г. парк этот имел не более 50% видового состава (пропала в 1930 г. *Araucaria imbricata*, безжалостно ободранная посетителями). Парк имел к 1932 г. 42 вида древесных экзотов, из которых необходимо упомянуть об американской сосне (*Pinus australis*), редко встречающейся в районе, и о большом высоком бордюре из *Choisia ternata*, могущем дать большой материал для размножения. Кроме того интересно отметить 10 кустов



Рис. 1. *Araucaria imbricata* — Араукария чилийская. Адлер, совхоз „Южная культура“.



Рис. 2. *Sequoia gigantea* — Секвойя гигантская. Сочи, б. Хлудовский парк.



Рис. 3. *Pinus excelsa* — Гималайская сосна. Сочи,
б. Хлудовский парк.



Рис. 4. *Broussonetia papyrifera* — Бумажное
дерево. Сочи, б. Хлудовский парк.



Рис. 5. *Juniperus virginiana polymorpha* — Виргинский можжевельник. Сочи, б. Хлудовский парк.



Рис. 6. *Chamaecyparis pisifera squarrosa* (*Frenellaglanca*). Сочи, б. Хлудовский парк.



Рис. 7. *Araucaria brasiliensis* — Бразильская
араукария Сочи. Московская ул. 20



Рис. 8. *Thujopsis dolobrata* — Туевик. Адлер, совхоз
Южная улица

олсандра, посаженных на открытом месте; они хотя и подмерзают в суровые зимы, но растут, цветут и плодоносят.

№ 7. Под этим номером мной отмечен громадный участок леса, разбитый в 1910/11 г. под парк знаменитым немецким садоводом Куфальдом в бывшем имении последнего царя Николая. В 1912 г. проект начал осуществляться и уже были проведены главные дорожки и посажены групповые ценные экзоты, но война с 1914 г. приостановила работы, и проект осуществлен не был. В настоящее время все заросло и выжили лишь кое-где наиболее выносливые из экзотов, которые в настоящее время перенесены в другое место, оставлены лишь переростки. К сожалению, во время беспризорности этого участка (1919—1928 гг.) многие ценные экзоты были загублены. Так например в 1929 г. мною были найдены среди дикого леса 3 очень хороших экземпляра чилийской араукарии, прекрасно уживающихся повидимому с местной растительностью; в 1932 г. при обследовании этого места я нашел лишь один засохший, выкопанный с корнями, пенек. Этот участок интересен нам для наглядности борьбы экзотов с местной растительностью и выводы кое-какие уже пожалуй можно сделать (о чем будем специально говорить в другой раз). Расположен этот парк около ст. Дагомыс в 10 км от Сочи, площадь его предполагалась в 20—25 га. От ст. Дагомыс к нему ведет узкая тропа; он занимает, как раз, все пространство между поселком Уч-дере и ст. Дагомыс.

№ 8. Парк совхоза Дагомыс расположен по левую сторону речки Дагомыс и занимает площадь до 10 га; попасть в него легче всего с железной дороги с остановки Дагомыс; идти следует по железнодорожному пути в сторону Сочи и, пройдя железнодорожный мост, свернуть налево в противоположную от моря сторону. В центре парка стоит большое 2-этажное здание (б. дворец и квартира управляющего), теперь дом совхоза. С северной стороны мимо парка, через весь совхоз, проходит шоссе (Туапсе—Сочи). Расположен парк на юго-западном пологом склоне, спускаясь до самой речки. Удачно спланированный, он включает в себе много ценных экзотов, из которых необходимо отметить следующие: 1) имеется роща хорошо плодоносящих пиний (*Pinus Pinea*), 2) интересные садовые формы самшита, 3) роща из черной сосны (*Pinus laricio*), 4) смешанные насаждения из криптомерий, секвойи и других экзотов. Вообще в этом парке мы можем проследить рост различных экзотов в смешанных группах, а так как насаждения имеют 25-летний возраст, то кое-какие выводы могут быть сделаны. До 1932 г. этот парк был в большой запущенности, дорожки заросли, дикие лианы душили ценные экзоты, но наравне с этим некоторые экзоты образовали густые естественные заросли. Между прочим *Rhus toxicodendron*, образовав по бокам тропинки, ведущей к морю, густую заросль, причиняет немало вреда.

С 1932 г. парк постепенно приводится в порядок. Имея до 80 различных видов экзотов, он является безусловно интересным источником получения исходного материала. Благодаря же наличию в совхозе рабочей силы можно обеспечить планомерный сбор семян и черенков.

№ 9. Участок б. Трапезникова — теперь дом отдыха кооператива б. ОГПУ. Расположен на самом берегу моря в устье небольшой горной речки, ежегодно в летнее время пересыхающей. Парк, площадью не более 3 га (культурная часть), занимает низину в ущелье и защищен со всех сторон небольшими горами. Густые насаждения, образовавшиеся из остатков леса и новых пород, дают густую тень. Почва глинистая с избытком увлажнения, сверху покрыта слоем в 10 см наносных частиц горных пород. Насчитывая в своем составе 54 вида, этот пункт интересен не по качеству насаждений и видовому составу, а по своему интересному местоположению, где можно было бы испытать в культуре более нежные субтропические растения вроде мандарина, цикаса, финиковой и кокосовой пальмы и др.

Из интересных экземпляров можно указать на *Abies concolor* f. *violacea*, *Acer japonicum*, *Pinus densiflora*, *Pinus mitis*. От Сочи этот участок находится на расстоянии 3 км по шоссе, по берегу же моря всего лишь 1 км в сторону Туапсе.

№ 10. Участок б. Дементьева — в 1932 г. строительство дома отдыха б. ЦЧО. Расположен этот участок на Цурюпинской стороне города Сочи в $1\frac{1}{2}$ км от моря и $1\frac{1}{2}$ км от шоссе. Культурная площадь парка около 4 га с 70 видами древесных пород. В 1927 г. мною было там найдено гораздо больше, но за период с 1928 по 1932 гг. много ценных видов (кустарников) было оттуда изъято Курупром. Там имеется прекрасная аллея из лип (единственная в районе), состоящая из различных видов (в большинстве случаев привитых), причем точно установить все виды мне не удалось необходимо сделать дополнительное обследование. Имеется хорошая коллекция кленов и ясеней, причем *Fraxinus americana* v. *acuminata* — единственное дерево не только в районе, но наверно на всем побережье, а возможно и в Союзе. Роскошный экземпляр *Dasylirium laurifolium* (H — $1\frac{1}{2}$ м), конфетное дерево (*Hovenia dulcis*) и ряд других ценных экзотов заставляют меня выделить этот участок как один из интереснейших натурализационных пунктов, а курортному управлению Сочи-мацестинского курорта необходимо принять все меры к сохранению оставшихся живых ценнейших экзотов.

№ 11. Парк дома отдыха ЦИКСа СССР (б. дача Блинова) — находится на Цурюпинской стороне г. Сочи, сейчас же за санаторием Курупра «Кавказская Ривьера», между морем и Туапсинским шоссе. Собственно территория дома отдыха составлена из нескольких прежних участков и дач (Блинова и др.), причем почвенные

условия в различных частях этой территории совершенно различны. Так например б. участок Блинова имеет тяжелую глинистую почву ежегодно заболачиваемую и безусловно неблагоприятную для древесных пород. Проведенная сеть водоотводных каналов хотя и улучшает несколько почвенный режим, но все же имеющаяся там древесная растительность представляет очень жалкий вид. Больших трудов стоило садоводу Нипарту развести на такой территории плодовый сад. Для таких территорий необходимо сделать особый подбор растений для озеленения. Начиная от дома бывшего лесничества по направлению к Ривьере, почва хотя и глинистая, но не заболачивается. Весь участок находится на пологом склоне, и здесь мы находим роскошную растительность, в противоположность блиновскому участку. Не отличаясь большим разнообразием видового состава, все же здесь имеются хорошо произрастающие редкие экзоты, как например: *Stilingia sebifera* (5 экз), *Aleurites cordata* (единственный взрослый экземпляр в районе) и *Callitris australis*. Кроме того на территории бывшего лесничества имеются интересные разновидности каменного дуба *Quercus ilex*.

№ 12. Санаторий и гостиница «Кавказская Ривьера» — находится на Цурюпинской стороне г. Сочи рядом с паровой пристанью. Это небольшой уголок на берегу моря, с прекрасной архитектурой зданий и подбором к ним зеленого фона. Большой недостаток зеленого оформления — это его слишком малые размеры по сравнению со зданиями санатория, и получается несоответствие растительности с общим оформлением территории, так и хочется несколько раздвинуть давящие громадные здания друг от друга. Богатая по видовому составу древесная растительность (82 вида) прекрасно размещена на территории, с большим вкусом подобрана, и в смысле художественного зеленого оформления там есть чему поучиться.

Из интересных растений можно указать на следующие:

1. *Aralia Sieboldii*
2. *Podocarpus macrophylla*.
3. *Cycas revoluta*.
4. *Phoenix canariensis*.
5. *Chamaerops humilis*.
6. *Trachelospermum jasminoides*. — прекрасная вечнозеленая лиана.
7. *Ficus stipulata* — вьющийся каучуконос.
8. *Passiflora coerulea*.
9. *Pinus excelsa* и ряд других.

Теснота расположения зданий имеет и положительную сторону, так как они защищают нежные растения, как фикусы и цикасы, от вымерзания.

№ 13. Парк Курупра (бывший Хлудовский парк) — площадью в 12 га — находится на Цурюпинской стороне на ровной

площади (долина) и начинается от конечной сочинской станции Союзтранса, как раз против «Кавказской Ривьеры». Имеет в своем составе до 150 видов древесных пород, из которых нужно отметить следующие:

1. *Broussonetia papyrifera*. Бумажное дерево (H — 3 м), хорошо плодоносит и дает самосев.

2. Роскошный экземпляр полиморфной формы виргинского можжевельника (*Juniperus virginiana* v. *polymorpha*).

3. Хорошая группа из японских кленов.

4. Голубая софора (*Sophora glauca*).

5. Жасмин Валиша (*Jasminum Wallichianum*), единственный в районе.

6. *Aesculus octandra* и ряд других.

7. *Chamaecyparis pisifera squarrosa* (*Frenella glauca*). К сожалению, общее состояние парка заставляет желать лучшего. Заложен он был в 1898 г. и многие растения уже требуют замены. Находясь в центре курорта, он имеет все шансы на особое к себе внимание и дело лишь за Хоз. упр. ЦИКСа. Примыкает к парку небольшой сад санатория «Сальве», имеющий очень интересные экзоты вроде *Gymnocladus*, *Jasminum officinale*, *revolutum*, *Trachelospermum jasminoides* и др. Этот пункт соединен нами с б. Хлудовским парком для удобства ориентировки.

№ 14. Парк дома отдыха лесных работников (участок в 1927 г. бывшего лесничества) — площадью около 3 га — находится на расстоянии 1 км по шоссе от «Кавказской Ривьеры» на юго-восточном склоне, имея в своем составе 56 видов древесных растений, из которых необходимо отметить следующие:

1. *Araucaria brasiliensis* — бразильская араукария, один из двух имеющихся в районе экземпляров.

2. *Tecoma grandiflora* — крупноцветная текома, редко попадающаяся в районе.

3. Громадные кусты душистой маслины (*Olea fragrans*), которые могут дать много черенкового материала.

№ 15. Парк санатория № 3 (дача б. Зиновьева) — площадью около 4 га — находится на расстоянии 2 км от «Кавказской Ривьеры» по Туапсинскому шоссе, выше по склону, где находится пункт № 14; расположен он на юго-восточном склоне, а так как вокруг по склону идут обработанные поля, то, проезжая по железной дороге, еще издали этот участок бросается в глаза, как прямоугольное зеленое пятно. В состав его входят 52 вида древесных растений, из которых необходимо отметить:

1. *Chamaecyparis obtusa aurea* — золотой солнечный кипарисовик, замечательно декоративное дерево.

2. Бонапартова сосна (*Pinus Bonaparteana*) — редко попадает в районе.

3. Восковое дерево (*Rhus succedanea*).
4. Пробковый дуб (H — 4 м.) (*Quercus suber*).
5. *Thujaopsis dolabrata* — туевик, прекрасный экземпляр (H — 9 м, Д — 35 см).
6. *Passiflora coerulea* — лиана, давшая массу самосева, который можно использовать для распространения в районе.

Содержится парк сейчас в порядке и может дать много исходного материала размножения.

№ 16. Сочинский городской приморский парк — тянется по всей прибрежной полосе города, с разнообразными почвами и рельефом. Начинаясь от маяка, он кончается около дендрария Техсемкультуры (б. Худяковский парк). В теперешний городской приморский парк естественно вошли следующие отдельные участки: 1) сад при Пушкинской библиотеке, 2) дача б. Цветковой, 3) дача Эйренэ, 4) Верещагинский парк. Территория прежнего приморского парка находится между Пушкинским садом и участком б. Цветковой. Она имеет сильно гористый рельеф с хорошо защищенными от ветров местами, где микроклиматические условия резко отличаются от сочинских.

В 1929 г. садовником Унгурисом там были произведены новые посадки. Такие нежные растения, как кокосовая и финиковая пальма, выдерживают там зиму без укрытия в течение 2 лет. Интересно было бы это место использовать под опытные акклиматизационные работы, причем желательно было бы испытать мандарины, апельсины, цикасы и др.

По видовому составу все вышеперечисленные участки довольно разнообразны. Для учета натурализации экзотов пожалуй самое интересное место — это участок б. Цветковой, где имеются уже 30-летние деревья, из которых наиболее обращают на себя внимание громадные деревья камфорного лавра, болотного кипариса (*Taxodium distichum*)¹, кокосовая пальма, большие заросли *Rhamnus alaternus* и некоторые сосны. Наиболее богат видами участок старого приморского парка (140 видов), причем есть там очень редкие экземпляры, как например: *Sciadopitys verticillata*, *Thuja occidentalis* f. *crispa*, *Freylingia cestroides*, *Kerria japonica*, *Cycas revoluta*, *Zamia*, *Rhus vernicifera*, *Araucaria imbricata*, *Cryptomeria japonica spiralliter falcata*, *Viburnum odoratissimum*, *Fabiana imbricata*.

На участке б. Верещагинского парка растет единственный экземпляр по всему Сочинскому району *Thujaopsis laetovirens* и бордюр из *Escalonia rubra* (бордюр дорожки, ведущей к морю со стороны санатория «Эйренэ»).

№ 17. Под этим номером мною обозначена вся Фрунзовская сторона г. Сочи. Описывать отдельно каждый сад не имеет смысла, так

¹ В 1934 г. «специалисты» Садземтреста вырубili это дерево, приняв его в безлиственном состоянии за засохший экземпляр.

как везде условия произрастания почти одни и те же, видовой состав также почти однороден везде, а редкие виды, попадающиеся в том или ином отдельном участке Фрунзовской стороны, будут отмечены особо.

Вся Фрунзовская сторона когда-то принадлежала одному лицу — Верещагиной, которая провела дороги, разделила всю площадь на мелкие участки и с громадной выгодой для себя их продала. Так как каждый участок имел площадь от 1 до 2 га, то и подбор экзотов был почти одинаков. Но все же кое-где попадались большие любители-садоводы, которые находили много ценных видов и собирали их на своих участках. Из таких можно указать на участок б. Исаина, Покровского, Горинова и др. Сейчас найти эти отдельные участки по фамилии владельца очень трудно, поэтому обследование и записи мною велись по существующей теперь планировке Фрунзовской стороны.

В этот натурализационный пункт входят следующие отдельные интересные участки:

а) санаторий «Розы Люксембург»; б) «Светлана» и «Элит»; в) дом б. Якобсон, г) дом б. Мамонтова, д) дом отдыха Цекпрос; е) санаторий им. Сталина, ж) дом б. Горинова и Филатова.

Наиболее интересные экзоты, о которых необходимо упомянуть особо, следующие:

1. На даче б. Корсаковой (против здания почты) имеется хороший экземпляр *Araucaria brasiliensis* — бразильская араукария.

2. На даче б. Якобсон (около шоссе) длинная зеленая изгородь из *Jasminum nudiflorum*, а на участке имеется 1 экземпляр *Eucalyptus viminalis*.

3. На даче б. Еришовой по Депутатской улице имеется прекрасная живая изгородь из *Cryptomeria japonica* v. *elegans* (элегантная криптомерия).

4. На даче Горинова и Филатова по Депутатской улице имеются редкие экземпляры *Picea polita*, *Magnolia fuscata*, *Pittosporum cornifolium*, *Pinus Bungeana*.

5. На территории санатория им. Сталина (дача б. Покровского) — *Phyllirea vilmoriniana*, *Citharexylum reticulatum*, *Cycas revoluta*.

6. На даче б. Бразоль — *Phoenix canariensis*, *Cocos* *Jatay*, *Dasylirion gracile*.

7. На территории дома отдыха Цекпроса — *Calycanthus floridus*, *Pritscharia filifera*, *Jasminum revolutum*, *humile*.

Кроме перечисленных интересных экземпляров на Фрунзовской стороне есть много маточников для получения исходного материала размножения (семена, черенки).

№ 18. Дендрарий техсемкультуры (б. Худяковский парк). Это самый богатый по количеству экзотов парк всего Сочинского района (до 650 названий).

Разбит он на площади 10—11 га с большим вкусом, художественно оформлен, с павильоном, портиками, трельяжами, статуями и фонтанами. Зелень была расположена по парку соответственно архитектурным замыслам, причем строго рассчитана была последовательность оформления. Заложен парк был в 1895 г. и после постройки главного здания было приступлено к устройству парка (примерно 1900 — 1901 гг.). Война 1914 г. приостановила дальнейшие работы, а в 1917 г. владелец парка Худяков продал его какой-то компании за 600 000 руб. Названная компания предполагала разделить на участки все имение и распродать парк по частям, причем был уже составлен план разбивки, поставлены столбы (по свидетельству землемера Энгельмана, производившего эту съемку), но Октябрьская революция помешала осуществлению этого варварского акта. С 1918 по 1921 гг., в период гражданских войн, этот парк сильно пострадал, масса видов пропала, некоторые были вырублены казаками (о том, что видовой состав был больше, свидетельствуют оставшиеся прежние этикетки, найденные в одном из сараев). Лишь в 1922 г. на него обратили внимание, и были приняты меры к сохранению этого большой ценности парка. В период с 1924 г. он был передан Сочинской опытной станции, сначала как парк им. КИМ, а затем из него сделали в 1926 г. отдел натурализации и акклиматизации опытной станции, в 1928 г. он был переименован в Ботанический сад опытной станции, в 1929 г. превратился в дендрологический сад Ботанического отдела Сочинской опытной станции, а в 1930 г. был передан Экзотлесу, переименованному потом в Экзотсемянлес, затем Техсемкультура, и назван был дендрарием.

Последнее название — дендрарий, — пожалуй, самое правильное, так как чисто ботанической части в парке всего лишь 5—10%. После периода упадка (с 1918 по 1924 гг.) с 1926 г. парк стал приводиться постепенно в порядок, что было делом нелегким, так как вся территория была сплошь засорена злостными сорняками вроде *Eulalia* и белой акацией и лишь к 1929 г. он был подчищен и было приступлено к улучшению его видового состава и расширению. Однако недостаток денег сильно затруднял дело и лишь с переходом в ведение Экзотлеса в течение 1931—1932 гг. на уход за парком были отпущены достаточные суммы. Но все же приведен он в порядок лишь с чисто внешней стороны, внутреннее же содержание осталось прежнее (т. е. с чисто любительским подходом). Громадная ценность собранного там материала (экзоты) теряет свое значение вследствие бессистемности расположения, неудобного ни для обозрения, ни для научно-исследовательских наблюдений. К сожалению, большой знаток дела, садовод-практик Бреннер, поддерживая в большом порядке парк, вводит новые породы, придерживаясь того же старого произвольно-любительского принципа, с которым к нему подходил и сам Худяков. Признавая громадную ценность этого дендра-

рия для ведения работ по натурализации и акклиматизации, было бы необходимым несколько изменить направление работ в нем. Прежде всего, необходимо использовать большие свободные площади, находящиеся выше парка по склону (до 15 га), и там, расширяя территорию парка, дать опытные групповые посадки ведущих пород ассортимента (*Liriodendron*, *Libocedrus*, *Cedrus* и др.). Кроме того этот парк имеет и большое популяризационное значение; поэтому необходимо выделить «уголок местной флоры», — кстати сказать, место для него само напрашивается на западном склоне, за оврагом, — а затем выделить участок в 4 га, сейчас же за дальней оранжереей, для устройства показательного участка ценных экзотов района. Питомникам же необходимо кроме промышленного придать и научно-опытное направление, где бы можно было вести работы по интродукции и селекции экзотов.

Останавливаясь подробно на описании видового состава дендрария и условиях произрастания в нем экзотов я не буду, укажу лишь, что там имеются налицо почти все встречающиеся в районе микроклиматические различия, начиная от долинных до открытых горных, южные, западные и восточные склоны и различные условия увлажнения.

Этот парк имеет в себе до 10% редких, нигде не встречающихся пород, но в то же время в нем еще не имеется до 10% всего видового состава Сочинского района.

№ 19. Территория Сочинской плодовой опытной станции — начинается сейчас же от железнодорожной остановки Бзугу в сторону гор и занимает площадь до 100 га. К сожалению, древесные экзоты разбросаны по всей территории отдельными группами, куртинами, отдельными посадками между зданиями, так что точно установить площадь, занятую экзотами, довольно трудно. Все посадки расположены на пологом южном склоне с глинистой почвой и не защищены с боков горами. Посадки начали производить с 1892 г., причем предварительно был организован питомник, снабжавший растениями окрестные дачи. По спискам, составленным Исаиным, ассортимент древесных пород был значительно больше до 1918 г. Сочинская опытная станция, получив бывший Худяковский парк, в первое время никаких забот о существующих зеленых насаждениях не проявляла, а тем более о новых посадках, поэтому естественно выжили и сохранились до настоящего времени лишь те, которые к 1918 г. были уже взрослыми. Имеет она на своей территории 162 вида древесных пород, причем сохранились еще редкие экземпляры и даже уникалы вроде *Pinus tuberculata*, *Mallotus japonicus*, *Rhus typhina*, *Carya aquatica*, *C. amara*, *Celtis*.

Нельзя не упомянуть также о прекрасных плодоносящих экземплярах *Benthamia fragifera*, *Gymnocladus canadensis*, *Pinus longifolia*, *Liquidambar orientalis*, *Fontanesa* и др. Во всяком случае, несмотря



Рис. 9. *Thuja gigantea* — Гигантская туя. Адлер, совхоз „Южная культура“.



Рис. 10. *Magnolia tripetala* et *Pinus Pinea* — Магнолия и Пиния. Адлер, совхоз „Южная культура“.



Рис. 11. *Albizzia julibrissin* — Шелковая акация. Адлер, совхоз «Южная культура».



Рис. 12. *Abies pumidica* (справа), *Sterculia platanifolia* (слева). Адлер, совхоз «Южная культура».



Рис. 13. *Cinnamomum glandulifera* (справа) — Камфарный лавр. *Keteleeria Fortunei* (слева) — Кетелеерия Фортуна. Адлер, совхоз „Южная культура“.



Рис. 14. *Abies grandis* et *Abies cerhalonica*. Адлер, совхоз „Южная культура“.

парк начинается крутым откосом, очень опасным в оползневом отношении; в 1932 г. были проделаны большие работы по укреплению. Поднявшись наверх (метров 50—60), вы попадаете в парк, состоящий наполовину из экзотов, наполовину из диких местных пород (остатки леса).

Не отличаясь хорошей планировкой и красивой группировкой растений, в нем все же есть немало интересных вещей, так например нигде в районе нет такой прекрасной аллеи из каштанолистного дуба (*Quercus Castaneifolia*), прекрасно плодоносящей и ежегодно дающей много самосева (к сожалению, никем не используется); имеется хороший (сравнительно) экземпляр пробкового дуба, камфорного лавра (*Cinnamomum camphora*). Хорошая аллея из пиний (*Pinus Pineae*) ведет от главного здания к воротам на шоссе (30 штук). Имеется редко попадающийся в районе *Cocculus laurifolia* и замечательное декоративное редкое растение *Sciadopithys verticillata*.

Но чем особенно интересен этот пункт, так это рощей криптомерий, находящейся на южном склоне к морю (около 100 экземпляров). В 1929 г. вся роща была густо обвита дикими лианами (*Smilax*, *Hedera* и др.), и казалось, нежные экзоты неминуемо должны были бы погибнуть; между тем криптомерии прекрасно боролись за свое существование, стараясь как бы оправдать доверие к себе, как к возможной лесной породе.

№ 23. Дом отдыха «X октября» (дача б. Покровского) — имеет площадь парка около 4¹/₂ га, насчитывая в видовом составе 76 экзотов, из которых можно отметить следующие:

1. *Abies concolor* f. *violacea* — прекрасный экземпляр (Н — 8 м, Д — 35—40 см).

2. *Sciadopithys verticillata*, *Eucalyptus viminalis*.

3. *Aralia Sieboldii* — прекрасный, ежегодно цветущий экземпляр.

4. *Phoenix canariensis* — находящийся все время без крыши на зиму.

5. Интересная лиана *Tracheospermum jasminoides*. Весь парк расположен на довольно крутом южном склоне, причем с одной стороны выходит на железнодорожную линию, с другой — на шоссе. Такое удобное местоположение и наличие прекрасных плодоносящих древесных экземпляров позволяют мне надеяться, что этот парк будет использован для получения исходного материала размножения.

№ 24. Санаторий № 9, выстроенный в 1931 г. на чьем-то заброшенном участке. В 1929 г., обследовав этот участок, я нашел много интересных экзотов, сохранившихся в густой заросли молодых диких растений. Не представляя ничего интересного с точки зрения архитектуры и видового состава зеленых насаждений, эта территория служила мне большим показателем борьбы новых пришельцев с местными аборигенами. В частности, нельзя не упомянуть о борьбе 3 экземпляров финиковых пальм, брошенных здесь на произвол судьбы.

1918 г. и стойко боровшихся в течение 12 лет без помощи человека за свое существование. Около 10 видов новых растений (криптомерия, мелия и др.) вышли из этой борьбы победителями. Мало ли они смогли бы выдержать еще в этой борьбе — сказать точно трудно, но теперь весь участок приведен в порядок, произведены новые посадки, но пока он еще мало представляет для нас интереса.

Находится этот пункт между железнодорожной линией, недалеко от остановки Мацеста-раз'езд, и шоссе, занимая площадь около 2 га южный открытый склон к морю).

№ 25. Санаторий № 7. Это громадное здание выстроено по проекту академика Щусева в 1929 г. и находится на б. участке Витте на крутом южном и юго-восточном склоне. С южной и восточной стороны граничит с шоссе, с северной подходит к грабово-дубовому лесу. Парк, площадью около 10 га, состоит из прежнего курортного парка б. Витте (около 2 га), около 2 га из новых посадок и остальное из диких остатков леса. Всего на этой территории имеется 74 вида экзотов, из которых можно выделить: 1) *Photinia serrulata* — редко попадающийся в районе; 2) *Laurus regalis* — единственный сохранившийся в районе экземпляр; 3) *Acacia dealbata* — занимающая целый склон, образуя целую заросль, причем, отмерзая периодически до корневой шейки, она быстро восстанавливается пневой и корневой порослью; 4) 10 хороших экземпляров траурного кипариса и очень много интересных редких форм кипарисовиков.

На этом же участке имеется небольшая группа из *Pinus Pinea* и *Pinus Pinaster*, где можно хорошо увидеть преимущество в росте *Pinus Pinaster*, которая глушит *Pinus Pinea*. Интересные данные получены здесь и в отношении теневыносливости некоторых экзотов.

№ 26. Дом отдыха ВЦИКа, находится на левой стороне долины реки Мацесты и включает в себя два частновладельческих участка (б. Зензинова и Пузанова). С юга и запада граница проходит по шоссе, а с севера и востока граничит с грабово-буково-дубовым лесом.

В 1926 г., когда они были в совершенно заброшенном виде, все кусты заросли, экзоты душились лианами и, казалось, что в них сохранилось очень мало ценного. Но уже в 1930 г. трудно было узнать это место: все было расчищено, и из-под зарослей колючки лианы освобождены экзоты, которые быстро оправились; это дало возможность обнаружить много ценных маточных экземпляров и редких представителей экзотической дендрофлоры. Так например на участке б. Зензинова есть единственные 3 экземпляра плакучей криптомерии (*Cryptomeria japonica pendula*) и плакучей формы кипарисовика (*Chamaecyparis Lawsoniana pendula*). Типичный экземпляр *Pinus halapensis*, 2 экземпляра *Pinus australis* и настоящий камфорный лавр (*Cinnamomum camphora*).

На участке б. Пузанова растет хороший экземпляр редкого вида бакхариса (*Baccharis halimifolia*), редко попадающаяся в районе садовая разновидность кипарисовика (*Chamaecyparis pisifera, filifera, aurea — variegata*), редкая в районе *Pinus monticola*, *Feijoa seloviana* и 10 штук настоящих лимонов (*Citrus limonum*), не говоря уже о целой плантации мандарин. Имея всего до 75 видов древесных пород, причем уже взрослых и плодоносящих, этот пункт может быть хорошим маточником для района. Администрация дома отдыха может сбор исходного материала поставить на хозрасчет, снабжая продукцией местные питомники.

№ 27. Старая Мацеста, санаторий № 5 находится в долине серной реки Мацесты в 3 км от моря и от железнодорожного разъезда Мацеста, в районе, называемом «Старая Мацеста». Вокруг двухэтажного здания санатория расположен парк площадью в $2\frac{1}{3}$ га. Не отличаясь большим разнообразием видов, он собственно был мною взят за основу, отражая влияния долинных условий на экзоты (всего в парке 57 видов). Кроме этого парка в районе Старой Мацесты есть большой сад при ванном здании и много мелких садов при жилых домах, которые также учитывались мною при обследовании. Так например на даче б. Неведомского есть большой бордюр (вернее изгородь) из *Elaeagnus edulis*, где можно ежегодно собирать большое количество семян.

Воздух по всей территории Старой Мацесты наполнен сероводородными испарениями, и новый человек вначале чувствует себя очень неприятно, но потом быстро привыкает. На растения сероводород повидимому влияет слабо, и на первый взгляд ухудшения роста или страданий растений не заметно.

№ 28. Поселок и дом отдыха «Охун», — в этот пункт входят несколько участков, составлявших поселок Охун, расположенный на южном склоне по обе стороны шоссе между речками Агурой и Охуном. Общая площадь под зелеными культурными насаждениями около 4 га (в сумме по отдельным участкам), где есть очень интересные экземпляры экзотов, из которых можно отметить камелии, кедр *Pinus insignis* и др. В общей сложности район Охуна может дать много исходного материала размножения. Всего мною найдено в этом пункте 64 вида экзотов. Попасть на эти участки можно от железнодорожной остановки «Охун», поднявшись по проезжей дороге или пешеходной тропе с $\frac{1}{2}$ км в гору (метров 50 над уровнем моря).

№ 29. Участок и дача б. Картавцева — расположен на высоте 300 м над уровнем моря в 3 км от Хосты и в $1\frac{1}{2}$ км от дома отдыха б. ГПУ «Красный штурм», от моря на расстоянии 2 км.

Прекрасно спланированный участок расположен на южном склоне горы Охун общей площадью в 3—4 га. К сожалению дальности расстояния от шоссе и железной дороги затрудняли долгое время

использование этого участка под санаторий. Но отчасти эта же близость расстояния сохранила много ценных экзотов в парке от уничтожения любопытными курортниками. В 1930 г. в нем было найдено 62 экзота, из которых особенно обращают на себя внимание роскошные экземпляры: *Abies Pinsapo*, *Abies Concolor*, *Juniperus horizontalis* (редкость в районе, всего 2 экз.), *Abies nobilis* (возможно *Abies magnifica*), *Fagus sylvatica atropurpurea*; группа из *Calycanthus floridus*, прекрасно и ежегодно цветущих и обильно плодоносящих, *Magnolia tripetala*, заросли *Acacia dealbata* и *Aralia nudicaulis*. Кроме того на этом участке имелся когда то питомник, который был заброшен, и из него образовалась роща из *Chamaecyparis Lawsoniana*, общей площадью в 100 кв. м. Недалеко от этого участка, только несколько ниже по склону, по направлению к Костю имеется участок б. Новицкого, имеющий до 66 экзотов, из которых можно отметить: *Kerria japonica albo — marginata* (единственный в районе), роскошные (7) экземпляры *Sequoja gigantea* (H — 15 м, Д — 50 см), *Liquidambar styraciflua*, *Pinus australis*, 1 экз., *Chamaecyparis pisifera plumosa* и 2 экз. *Abies numidica*.

Высота над уровнем моря и сравнительно открытое местоположение обуславливают безусловно более суровые климатические условия, поэтому сбор исходного материала с этих экзотов, менее изнеженных, чем в прибрежной полосе, может дать много ценного для продвижения на север (*Cedrus Deodara*, *Chamaecyparis* и др.).

Компактно сгруппированные зеленые насаждения облегчают сбор семян и дают некоторую гарантию за чистосортность. Поэтому этот интродукционный пункт (дача б. Картавцева и Новицкого) может быть одним из лучших маточников на побережье.

№ 30. Дом отдыха Крайисполкома (участок и дача б. Красного) расположен на нагорном крутом склоне и находится в 1 км от Хосты в сторону Сочи, недалеко от Хостинского железнодорожного тоннеля, с северной стороны граничит с шоссе, а восточной и южной переходит в естественный лес (смешанный, с преобладанием граба или местами из пицундской сосны). Выбор места сделан проф. Красиным, известным ученым, положившим начало натурализации и акклиматизации на побережье и основавшим Батумский ботанический сад на Зеленом мысу. Сильно неровный рельеф позволил проф. Красному на протяжении не более 5—6 га использовать для культуры различные по требовательности к влаге экзоты. Наличие защищенных мест позволило ему вырастить некоторые нежные пальмы, ветки которых имеются еще и сейчас. Всего на этой территории имеется до 200 видов древесных растений, из которых до 10 видов не определены до сих пор (3 пальмы, 2 бамбука, 2 юкки, 1 инжир и 2 нецветущих рода). К сожалению, многие растения были расхищены в период с 1923 по 1928 гг., и лишь в 1929 г. было приступлено к расчистке сада и приведению в порядок; из-под

зарослей дикой колючки появились такие редкости, что нельзя даже было предполагать о возможности их существования в таких условиях.

Этот натурализационный пункт должен быть взят под особое наблюдение местных натурализаторов и использован как маточник, причем неизвестные растения должны быть определены.

№ 31. Хостинский городской парк (где гостиница «Пионер») начинается сейчас же от ст. Хоста, перейдя шоссе, вдоль которого он и тянется, и составлен из нескольких бывших частных владельческих дач. Насчитывая до 68 видов экзотов, этот парк интересен только по некоторым представителям, как например пробковый дуб (*Quercus Suber*), *Citharexylum reticulatum*, редко попадающийся в районе, *Lavandula spica*, *Cycas revoluta*, *Colletia cruciata*, *Pinus Coulteri* и некоторые другие.

№ 32. Дом отдыха Майковского отделения работников просвещения (участок и дача б. Бахрушина) — находится в селе Хоста, между главным шоссе и шоссе к железнодорожной станции, примерно на расстоянии 1 км от нее, и расположен на западном склоне. Это небольшой сравнительно участок (до 2 га), но богатой коллекцией экзотов (69 видов), из которых можно отметить 2 роскошных экземпляра *Pinus Sabiniana*, *Cupressus lusitanica glauca*, *Robinia hispida*, *Podocarpus macrophylla*, *Pinus Coulteri*, *Pritschardia filifera*, *Morus alba f. pendula* и много кустов олендр. Бросается в глаза громадный экземпляр *Pinus insignis* (Н—25 м, Д—100 см). Наличие в парке нескольких групп и большого количества экземпляров отдельных видов выдвигают этот пункт как возможный маточник, хотя бы для местных нужд; наличие садовника обеспечит правильный сбор исходного материала. К этому же участку примыкает и б. дача Кривцова с большим количеством видов (72), из которых можно отметить: *Glycine frutescens*, *Broussonetia papyrifera*, *Lonicera fragrantissima* и ряд других. Соединив эти два участка в один маточный пункт, можно сбор семян и черенков поставить на хозрасчет (с прибылью для любого учреждения, взявшегося за это дело).

№ 33. Дом отдыха Северокавказского военного округа (дача б. Ермолова) — находится на расстоянии 1 км от ст. Хосты в сторону Адлера. Этот дом отдыха объединяет в себе два участка: один находится между железнодорожной линией и шоссе, другой от шоссе выше по склону, гранича с культурными участками Хосты, а с восточной стороны — с лесом. Парк, состоящий следовательно из двух частей, расположен на крутом южном склоне и состоит из 75 видов древесных растений, из которых можно выделить: 1) *Citharexylum reticulatum*; 2) *Syriga persica* (единственная в районе); 3) *Pritschardia filifera*; 4) *Feihoa selloviana* и ряд других.

Этот участок очень интересен как натурализационный пункт, так как многие экзоты дали ценные результаты по учету степени натурализации их по району (теневыносливость, самосев, борьба с местной растительностью и т. д.) Культурная часть парка около 5 га.

№ 34. Дом отдыха научных работников (дача б. Лямина) — находится на высоте 150 м над уровнем моря, между Хостой и селением Верхней Николаевкой. Парк, площадью около 5 га, расположен на южном склоне и имеет 120 видов экзотов, из которых можно указать на: 1) *Picea polita* — редкая в районе ель; 2) *Diospyros Kaki*; 3) *Arnicaria brasiliensis*; 4) *Sophora japonica*; 5) *Pinus Bonparagon*; 6) *Acacia melanoxylon*; 7) *Feijoa Seloviana* и 8) *Chamaecyparis phaeoidea leptoclada*. Этот участок интересен как натурализационный пункт. Сбор исходного материала там вряд ли имеет смысл проводить ввиду малого количества экземпляров отдельных видов.

№ 35. Парк совхоза «Южная культура» (10 — 11 га) — находится в долине реки Мзымты по левую сторону в 2 км от города Адлера. Ровная территория с аллювиальными почвами, с достаточным увлажнением, создает в этом месте исключительно благоприятные условия роста для всех экзотов. И действительно, нигде в районе мы не видим такого буйного роста, как в этом парке. Это имение генерала Драчевского, который, как говорят, выиграл его случайно где-то в карты, отчего и носило оно прежде название «Случайное». Сам Драчевский никогда там не был, а все работы возглавлял садовод — немец Гарбе, могила которого находится в парке. Главные посадки были произведены в 1910—1911 гг., причем в хозяйстве был заложен большой питомник, который во время германской и гражданской войн был заброшен, и сейчас это место превратилось в хорошую густую рощу хвойных пород, увеличив на 2 га площадь парка. Хорошо спроектированный парк в ландшафтном английском стиле был и оформлен хорошо, а так как он еще сравнительно молодой, то несмотря на плохой уход за время 1918—1925 гг. он сейчас имеет прекрасный вид. Правда, там нет хорошо расчищенных дорожек, нет бьющих фонтанов, но искусно выкопанные пруды и большие зеленые полянки среди искусно подобранных декоративных экзотов вполне заменяют и дорожки и фонтаны, и, пожалуй, если бы они были, то парк не оставлял бы у посетителей такого яркого впечатления, как сейчас. Трудно конечно передать словами рисунок парка, нужно там побывать и убедиться самим. К сожалению, парк этот мало доступен для обозрения, ввиду дальности расстояния от курортных мест и удивительно скверных путей сообщения: от железнодорожной станции Адлер нужно ехать на автобусе или на извозчике километра 3 до реки Мзымты (в устье), переехать на лодке-пароме на другой берег¹ и пройти с километр по берегу

¹ Мост построен весной 1934 г.

моря. Парк этот состоит преимущественно из хвойных пород, причем сидят они не поодиночке, а группами, причем садовые формы так хорошо рассажены перед ними, что у вас получается полное впечатление одного большого массива. С точки зрения натурализации этот парк представляет громадный интерес, так как там собрано немногим меньше экзотов, чем в б. Худяковской парке в Сочи (№ 18), но тут они интереснее тем, что сидят группами, посаженными примерно в одно время, так что степень пригодности или преимущества того или иного вида в условиях района здесь можно проследить наглядно как нигде в другом месте района. Породы, не плодоносящие в других пунктах района, здесь дают всхожие семена и образуют массовый самосев (*Liriodendron tulipifera*).

Ежегодно этот парк дает массу семян, которых почти никто не собирает, так как совхоз овощной, и питомник древесных пород хотя и имеется, но особого внимания на него не обращается. Это единственный в районе крупный маточник, который мог бы снабжать исходным материалом размножения не только Сочинский район, но и служить для экспорта.

По обработке полученных материалов нами составлена приведенная ниже таблица, где можно увидеть местонахождения каждого вида в районе, количество экземпляров и значение для озеленения курортной зоны Сочинского района, для которого мною приняты следующие обозначения:

I — это породы, прекрасно развивающиеся в условиях Сочинского района, плодоносящие, или быстро возобновляющиеся вегетативно (черенки, поросль) и разведение которых вполне возможно теплее на местных питомниках. Под этим обозначением идут только растения, которые могут играть видную роль в озеленении курортной зоны. В дальнейшем нами будет составлена подробная характеристика каждого вида и его место и роль в зеленых насаждениях.

II — под этим обозначением идут породы, тоже хорошо развивающиеся в условиях Сочинского района, но имеющие второстепенное значение, без которых пока еще можно обойтись, т. е. или у них есть более счастливый конкурент, или они могут идти в качестве отдельных солитеров на больших площадях, или требуют определенных групповых сочетаний, редко применяющихся в данное время. Конечно это еще не значит, что их совершенно не надо разводить, но что они должны быть разводимы во вторую очередь, т. е. тогда, когда растения первой очереди будут разведены в достаточном количестве.

143 вида, несмотря на большую или меньшую ценность в зеленом строительстве, не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй очереди, потому что не ясна степень их натурализации, т. е. или имеет их малое количество экземпляров, по которым нельзя судить, или о



Рис. 17. *Maluotus japonicus* — Маллотус японский.
Адлер, совхоз „Южная культура“.



Рис. 18. *Eriobotria japonica* — Мушмула. Адлер,
совхоз „Южная культура“.



Рис. 19. *Cedrus atlantica glauca* — Атласский голубой кедр. Адлер, совхоз „Южная культура“.



Рис. 20. *Abies nobilis glauca* — Благородная голубая пихта. Адлер, совхоз „Южная культура“.



**Рис. 21. *Chamaecyparis obtusa lycopodioides* (пирамидальные).
Адлер, совхоз „Южная культура“.**



Рис. 22. *Chamaecyparis obtusa aurea* et *Chamaecyparis pisillera filifera nana* — compacta. Адлер, совхоз „Южная культура“.



Периодически вымерзают, но ежегодно возобновляются от пня; если же они имеют большую ценность по цветению или листве, то необходимо принимать меры защиты и вести с ними дальнейшую селекционную работу; или наконец сюда же отнесены растения, ценность которых для зеленого строительства неясна. Все эти растения обозначены словом натурализация—«натур».

II наконец последняя группа — 180 видов, безусловно не имеющая значения для района, потому что они: 1) вымерзают, 2) страдают от засухи, 3) не имеют никакого декоративного и производственного значения.

Морозостойкость обозначена следующими цифрами:

I совершенно не страдают от морозов и засухи.

II обмерзают периодически годовалые молодые побеги, но растение быстро восстанавливает потерю. Для пальмы этот знак означает легкий охват морозом листьев.

III обмерзают 2—3-летние побеги или сильный охват листьев у пальмы, вплоть до потери $1/2$ кроны.

IV обмерзает вся крона до корневой шейки или гибель всей кроны листьев у пальмы, неповрежденной остается лишь сердцевина и точка роста.

V погибает совершенно.

В таблицах буква «З» означает, что это растение страдает от засухи, а цифры за этой буквой означают степень страдания от засухи.

При обозначении пунктов нахождения растений в районе буквами С, Х, А обозначаются соответственно Сочи, Хоста и Адлер. Если при этой букве нет сноски в примечании, значит растение встречается во многих садах города. Знак А означает, что растение требует укрышки на зиму.

МАСШТАБ В 1 СМ.-1,5 КМ

МАСШТАБ В 1 СМ.-1,5 КМ



НАТУРАЛИЗАЦИОННЫЕ УЧАСТКИ

---ГРАНИЦА РЕСПУБЛИКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

700 номеров различных пород, найденных мною в Сочинском районе, конечно не исчерпывают всего, что может быть испробовано нами для культуры из мировых древесных ресурсов. Несколько номеров не вошли в список ввиду неточности определения (липы в пункте № 10, игерокарпия в пункте № 30), или совершенно непригодных (около 20 видов) ввиду отсутствия у них цветения и плодоношения.

Суммируя приведенные выше данные, можно составить следующую таблицу.

	Страны света									
	Южная Америка	Северная Америка	Европа	Средиземноморская область	Малая Азия, Туркестан, Гималаи, Средняя Азия	Кавказ, Закавказье, Крым	Сибирь, Сев. Европа	Австралия	Итого	
Липа	2	28	5	9	10	8	—	2	120	
Игера	5	49	15	10	11	25	1	6	174	
Лавр	11	28	6	6	18	12	—	10	143	
Или	9	46	24	4	10	25	4	17	176	
Итого	27	151	50	29	49	70	5	35	613	

То же в процентах

Липа	4,4	23	4	7	8	7	—	1,5	100	
Игера	8,2	28	9	6	6	14	0,5	3,5	100	
Лавр	14,7	20	6	4	13	8	—	7	100	
Или	14,7	26	24	2	6	16	2	9	100	
Итого	4,4	25	8	5	8	11	1	6	100	

* Указано только количество видов без садовых форм.

Из этой таблицы видно, что больше всего растений, вполне натурализованных и могущих войти в ассортимент Сочинского района, да японо-китайский район (47%). Это вполне согласуется с данными проф. Краснова (см. «Курс земледелия») и Г. Т. Селянинова («Климатические аналоги Черноморского побережья Кавказа»), которые видели в японо-китайском районе тот интродукционный очаг, из которого мы должны черпать растительные ресурсы для субтропического уголка нашего Союза. Безусловно, 56 натурализованных видов составляют лишь небольшую часть того, что еще можно получить из этого района. Следующий довольно крупный интродукционный очаг—это Северная Америка. Правда, такое указание очень грубо, так как Северная Америка, насчитывая до 600 различных видов древесных пород, обладает различнейшими климатическими районами, начиная от суровых арктических до жарких тропических, но выяснение интродукционных очагов по климатическим аналогам побережья не входит в мою задачу. Все же необходимо заметить, что по видимому японо-китайский район гораздо больше нам интересен, чем северо-американский, для интродукции древесных пород. Австралия дала нам всего лишь 1,5% пригодных для культуры видов, и перспективы получения новых довольно слабые; она имеет гораздо большее значение для Батумского района, где одни эвкалипты (до 10 видов) представляют громадное народнохозяйственное значение.

Любопытно отметить, что местные кавказские породы составляют всего лишь 7% всего ведущего ассортимента и 11% из всех кавказских видов, имеющихся в парках Сочинского района. Но я считаю, что местные кавказские ресурсы почти не затронуты и там в себе богатейший материал для озеленения не только прибрежной курортной зоны, но и наших северных районов.

В 1930 г. мною были обследованы альпийская и субальпийские зоны в районе Анбги и нами (вместе со студентами отделения зеленого строительства) были найдены в полном цвету роскошные экземпляры 4 видов дафний, 3 видов рододендронов, некоторые черники (*Vaccinium*) и ряд других. Поэтому необходимо в ближайшее время обратить внимание на кавказский интродукционный очаг и организовать план сбора исходного материала размножения и испытать в озеленении курортной зоны.

ТАБЛИЦЫ РАСТЕНИЙ

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
Под'отдел Gymnospermae	Голосемянные	—	—
Класс Cycadales	Саговые	—	—
1. <i>Cycas revoluta</i> Trunb.	Цикас, саговник	Cycadaceae	Япония
2. <i>Zamia</i> , sp.	Цамия	»	»
Класс Ginkgoales	Гинкговые	Ginkgoaceae	Япония, Тай
3. <i>Ginkgo biloba</i> (Syn. <i>Salisburya adiantifolia</i>)	Гинкго	»	Япония, Тай
Класс Coniferae	Хвойные	—	—
4. <i>Abies alba</i> Mill. (<i>A. pectinata</i> , DC)	Гребенчатая пихта	Pinaceae подс. Abietineae	Европа
5. <i>Abies balsamea</i> Mill.	Бальзамическая пихта	»	Сев. Азия
6. <i>Abies brachyphylla</i> Maxim (Syn. <i>homolepis</i> Sieb. et Zucc.)	Пихта «Ураши-ромоми»	»	Япония
7. <i>Abies bracteata</i> Hook. et Arn.	Прицветниковая пихта	»	Калифорния
8. <i>Abies cephalonica</i> Lk. var <i>apollinis</i> (Syn. <i>pachalca</i> Heldr.)	Греческая пихта	»	Греция
9. <i>Abies cilicica</i> , Carr.	Пихта киликийская	»	Мал. Азия
10. » <i>concolor</i> , Lindl.	Пихта колорадская	»	Калифорния
11. » <i>violacea fastigiata</i> hort.	Пирамидальная форма колор. пихты	»	»
12. <i>Abies firma</i> Sieb. et. Zucc. Syn. <i>A. Momi</i> Sieb.	Японская пихта	»	Япония
13. <i>Abies grandis</i> Lindl.	Пихта гигантская	»	Сев. Азия
14. » <i>Mariesi</i> Mast.	Пихта Мариза	»	Япония
15. » <i>nobilis</i> , Lindl. f. <i>glauca</i>	Пихта голубая	»	Сев. Азия

Местонахождение и районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
№ 12, 16, 17, 18, 21, 32, 35, С	14	III—IV	Не цвет.	II	
№ 18	1	IV	»	Нет	
№ 22	36	I	Плод.	I	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
№ 18, 35, 33, 30, 5	11	I	Плод.	Нет	
№ 35	27	I	»	»	
№ 35 и Комсомоль- ский ул., д. 19	2	I	»	Натур.	¹ Погибла от за- сухи в 1928/29 г.
№ 18	1	3.IV	Цвет. ¹	Нет	
№ 30 и № 35	2	I	»	Натур.	
№ 35	1	I	»	»	
№ 11, 17, 18, 33, 35, С	16	I	»	II	
№ 18	2	I	Не цвет.	Нет	
№ 10, 11, 17, 18, 19, 21, 24, 25	69	I	Плод.	I	
№ 17, 18, 35	3	I	»	Натур.	
№ 35	1	I	Цвет.	Нет	
№ 16, 18, 29, 35	5	I	»	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
16. <i>Abies Nordmanniana</i> Spach	Кавказская пихта	Pinaceae подс. Abietineae	Кавказ
17. » <i>numidica</i> De Lanno	Пихта нумидийская	»	Сев. Африка
18. <i>Abies Pinsapo</i> Boiss.	Пихта испанская	»	Испания
19. <i>Abies Pindrow</i> Spach. (Syn. <i>A. Webbiana</i> var. <i>Pindrow</i> Brandis)	Пихта Пиндрова	»	Зап. Гималаи Афганистан
20. <i>Abies Sibirica</i> Ledeb.	Пихта сибирская	»	Сев.-восток РСФСР Сибирь
21. <i>Abies, Veitchii</i> Carr.	Пихта Вича	»	Япония
22. » <i>religiosa</i> Lindl.	Пихта священная	»	Мексика
23. <i>Araucaria brasilinesis</i> Bich.	Бразильская араукария	Pinaceae подс. Araucarieae	Бразилия
24. » <i>imbricata</i> Pav.	Чилийская араукария		Чили
25. <i>Callitris glauca</i> R. Br.	Калитрис голубой	Подс. Cupressineae	Австралия
26. <i>Cedrus atlantica</i> Monetti	Атласский кедр	Pinaceae подс. Abietineae	Алжир
27. » <i>atlantica fastigiata</i> Carr.	Колоновидн. форма атл. кедра	»	Сад. форма
28. <i>Cedrus atlantica pendula</i>	Плакучая форма атл. кедра	»	»
29. » » <i>pyramidalis</i> Paillet	Пирамидальная фор. атл. кедра	»	»
30. <i>Cedrus Deodara</i> Loud.	Гималайск. кедр	»	Гималаи
31. » » <i>gigantea</i> hort. (Syn. <i>C. D. Crassifolia</i> Knight)	Гигантск. форма гимал. кедра	»	Сад. форма
32. <i>Cedrus Deodara aurea spica</i> hort.	Золотист. форма гимал. кедра	»	»

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
По всему району	∞	I	Плод.	I	
№ 17, 18, 35, X ¹ , C ²	8	I	»	II	¹ Дача б. Новиц- кого
№ 2, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 29, 35, X, C.	43	I	»	I	² Дом б. Цветко- вой, Комсомоль- ская ул.
№ 35 ¹	1	I	Цвет.	Натур.	¹ Дача Майерас
№ 35	5	I	»	Нет	
№ 35	1	I.3	»	»	
№ 18, 35	2	—	Не цвет.	Натур.	Введены в Со- чинском районе в 1931 г.
№ 17, 14, C ¹ , 34, 18, 16	6	I.3.IV	Цвет.	Нет	Угол Комсомоль- ской и Музей- ной
№ 7, 17 (Санатор., Светлана) № 35	4	I.3.IV	»	»	
№ 18, 11, 3, C ¹	7	I	Плод.	II	¹ Д. б. Задорина.
№ 18, 19, 20, 21, 11, 13, № 10, 30, 16, 12, X 11, 35, 17, 29 и др.	>100	I	»	I	Московская 2,
№ 18, 19, 35	5	I	»	I	
Адлер около При- мор. парка	1	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 19, 35 и мн. других	>50	I	Плод.	I	
По всему району	∞	I	»	I	
—	<3	I	»	I	
№ 18, C ¹ , 29, 5, 35,	7	I	»	I	¹ Дача Кондрать- ева

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
33. <i>Cedrus Libani</i> Barr.	Ливанский кедр	Pinaceae подс. Abletineae	Мал. Азия
34. » » <i>glauca</i> Carr.	Голубая форма ливанского кедр- ра	»	Сад. форма
35. » » <i>nana</i> Loud.	Низкая форма ли- ванского кедрa	»	»
36. <i>Gephalotaxus drupacea</i> Sieb. et Z.	Цефалотаксус костянковый	Taxaceae подс. Taxineae	Япония
37. <i>Gephalotaxus Fortunei</i> Hook.	Цефалотаксус Фортуна	»	»
38. <i>Gephalotaxus peduncu- lata fastigiata</i> , Carr.	Пирамидальный цефалотаксус	»	Сад. форма
39. <i>Gephalotaxus peduncu- lata fastigiata aurea va- riegata</i> , hort.	Золотист. пирами- дальный цефал	»	»
40. <i>Chamaecyparis Lawso- niana</i> Parl.	Лавсонов кипа- рис	Cupressaceae подс. Cupressineae	Сев. Ам.
41. <i>Chamaecyparis Lawso- niana argentea</i> hort.	Серебристая фор- ма лав. кип.	»	Сад. форма
42. <i>Chamaecyparis Lawso- niana aurea</i> hort.	Золотистая форма лав. кип.	»	»
43. <i>Chamaecyparis Lawso- niana aurea variegata</i> hort.	Золотистая пест- ролист. форма лав. кипариса	»	»
44. <i>Chamaecyparis Lawso- niana aurea spicata</i> hort.	Золотисто-конеч- ная форма лав. кипариса	»	»
45. <i>Chamaecyparis Lawso- niana ericoides</i> Kent.	Вересковид. фор- ма лав. кип.	»	»
46. <i>Chamaecyparis Lawso- niana filiformis compacta</i> hort.	Нитчатая компакт. форма лав. кип.	»	»
47. <i>Chamaecyparis Lawso- niana glauca</i> hort.	Голубая форма лав. кип.	»	»

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 10, 3, 5, 6, 30, 12, 11, 16, 25, С	>50	I	Плод.	II	¹ Комсомольская, 18
То же	>50	I	»	II	
№ 6	1	I	Цвет.	Нет	
№ 18, 22, 35, С¹	>25	I	Плод.	II	
13, 18, 15, 30, 17, 10, 32, 35 Сочи	>50	I	»	I	
№ 21 натуральн. пункт	<50	I	Цвет.	I	
№ 19	2	I	»	I—II	
По всему району	∞	I	Плод.	I	
№ 18, 35	—	I	»	II	
№ 18, 35	—	I	»	I	
№ 18, 35	4	I	Цвет	—	
№ 18, 35	6	I	Плод.	I	
№ 35	1	I	Не цвет.	натур.	
№ 18, 35	2	I	Цвет.	II	
По всему району	∞	I	Плод.	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
48. <i>Chamaecyparis Lawso- niana gracilis</i> Wat.	Изящная ф. лав. кип.	Cupressaceae подс. Cupressineae	Сад. форма
49. <i>Chamaecyparis Lawso- niana lutea</i> hort.	Желтая ф. лав. кип.	»	»
50. <i>Chamaecyparis Lawso- niana nana</i> hort.	Низкая ф. лав. кип.	»	»
51. <i>Chamaecyparis Lawso- niana nana glauca</i> hort.	Низкая голуб. ф. лав. кип.	»	»
52. <i>Chamaecyparis Lawso- niana pendula</i> hort.	Плакучая ф. лав. кип.	»	»
53. <i>Chamaecyparis Lawso- niana prostrata glauca</i> hort.	Раскидистая ф. лав. кип.	»	»
54. <i>Chamaecyparis Lawso- niana pyramidalis</i> P. Smith u. Cie	Пирамидальная ф. лав. кип.	»	»
55. <i>Chamaecyparis Lawso- niana robusta</i> hort.	—	»	»
56. <i>Chamaecyparis Lawso- niana Westermannii</i> hort.	Вестерманов ки- парис	»	»
57. <i>Chamaecyparis nutkaën- sis</i> Spach.	Желтый кипарис, Душное дерево	»	Сев. Аме- рика
58. <i>Chamaecyparis nutkaën- sis arg nteo-variegata</i> hort.	Серебр. пестрол. ф. желт. кип.	»	Сад. форма
59. <i>Chamaecyparis nutkaën- sis aurea variegata</i> hort.	Золотисто-пест- рол. ф. желт. кип.	»	»
60. <i>Chamaecyparis nutkaën- sis compacta</i> hort.	Компактная ф. желт. кип.	»	»
61. <i>Chamaecyparis nutkaën- sis glauca</i> hort.	Голубая ф. желт. ип.	»	»
62. <i>Chamaecyparis Obtusa</i> Sieb. et Zucc.	Японский кipa- рисовик (сол- нечный кipa- рис)	»	Япония
63. <i>Chamaecyparis Obtusa</i> <i>aurea</i> hort.	Золотистая ф. (солн. кипарис)	»	Сад. форма

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35	4	I	Цвет.	II	
№ 18	2	I	»	I	
№ 18, 35	3	I	»	II	
№ 18, 35	4	I	»	II	
№ 15, 18	2	I	»	Натур.	
№ 35, 18	4	I	»	II	
№ 18, 35	4	I	»	II	
№ 18	1	I	»	II	
№ 18, 35	2	I	»	II	
№ 13, 33, 21, 15, 11, 17, ХС, 35, 18	>25	I, 3, III	»	II	
№ 18, 35, С ¹ , Х ¹	11	I	Плод.	II	¹ Д. Б. Годзи, Мо- сков. ул., г. Хоста, д. Б. Кривцова
№ 18, 35	5	I	Цвет.	II	
№ 18, 35, 33, С	6	I	Не цвет.	I	
№ 18, 35	8	I	Плод.	II	
№ 18, 35, 2, 17, 16, 30, 19, 23, С, Х	>25	I	»	II	
№ 18, 35, 15, 2, 12, 16, 17, 32, 33, С	13	I	Цвет.	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
64. <i>Chamaecyparis Obtusa lycopodioides</i> , Carr.	Плауново-лист- ная ф. (солн. кипарис)	Cupressaceae подс. Cupressineae	Сад. форма
65. <i>Chamaecyparis Obtusa lycopodioides aurea</i> hort.	Золотистая ф. (солн. кип.)	»	»
66. <i>Chamaecyparis Obtusa nana</i> , Carr.	Низкая ф. (солн. кипарис)	»	»
67. <i>Chamaecyparis nana Obtusa aurea</i> hort.	Золот. низкая ф. (солн. кипарис)	»	»
68. <i>Chamaecyparis pisifera</i> Sieb. et Zucc.	Саварский кипа- рисовик (солн. кип.)	»	Япония
69. <i>Chamaecyparis pisifera aurea</i> hort.	Золот. ф. (солн. кип.)	»	Сад. форма
70. <i>Chamaecyparis pisifera argenteo-variegata</i> hort.	Серебр. пестрол. ф. (солн. кип.)	»	»
71. <i>Chamaecyparis pisifera filifera</i> hort.	Нитчатая ф. (сол- нечн. кип.)	»	»
72. <i>Chamaecyparis pisifera filifera aurea variegata</i> hort.	Нитчато-золот. пестрол. ф. (сол- нечн. кип.)	»	»
73. <i>Chamaecyparis pisifera filifera nana</i> Hesse.	Нитчато-низкая ф (солн. кип.)	»	»
74. <i>Chamaecyparis pisifera nana</i> hort.	Низкая ф. (солн. кип.)	»	»
75. <i>Chamaecyparis pisifera nana aurea variegata</i> hort.	Низко-золот. пе- строл. ф. кип.	»	»
76. <i>Chamaecyparis pisifera plumosa</i> hort.	Игловидн. ф. кип.	»	»
77. <i>Chamaecyparis pisifera squarrosa</i> Beissn.	Юношеская ф. кип.	»	»
78. <i>Chamaecyparis Sphaeroidea</i> Spach.	Белый кипарисо- вик	»	Сев Аме- рика
79. <i>Cryptomeria japonica</i> Don.	Японская крипто- мерия	C. Pinaceae подс. Taxodiaceae	Япония

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Патурлизац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35, С	4	I	Цвет.	II	Г. Сочи, д. б. Но- вицкого, г. Хо- ста, д. б. Мамон- товой
№ 18, 35	2	I	Не цвет.	II	
№ 18, 35, 17, 16, 30, 19	18	I	»	II	
№ 18, 35, 15, 19, 17	6	I	»	I	
№ 18, 35, 29, X, С, 26	>50	I	Плод.	I	
№ 18, 35, 26, С, X	12	I	Цвет.	I	
№ 18, 36, X ¹ , 29, С ¹ , 17, 16	14	I	»	I	
№ 18, 35, 29, X, С, 26, 16	>20	I	»	II	
№ 18, 35, 29, 19, С	>10	I	»	I	
№ 18, 35, 19, 17, 16, С	16	I	Не цвет.	I	
№ 18, 35	4	I	Цвет.	II	
№ 18, 35, 17, С	>25	I	»	I	
№ 18, 35, 17, 13, 26, 28	>50	I	»	I	
№ 18, 35, 17, 13, 26, 28	>25	I	»	I	
№ 18, 35	6	I	Плод.	II	
III натур. пункт	∞	I	»	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
80. <i>Cryptomeria japonica araucarioides</i> hort.	Араукариевидн. яп. криптомерия	С. Pinaceae подс. Taxodiaceae	Сад. форма
81. <i>Cryptomeria japonica elegans</i> Veitch.	Криптомерия изящная	»	»
82. <i>Cryptomeria japonica viridis</i> hort.	Зелен. ф. японск. крипт.	»	»
83. <i>Cryptomeria japonica spiraler falcata</i> , Sieb.	Змеевидн. ф. яп. крипт.	»	»
84. <i>Cryptomeria japonica robusta</i> hort.	—	»	»
85. <i>Cunninghamia Sinen-sis</i> , R. Br.	Китайская кунингамия	Pinaceae подс. Araucariaceae	Китай
86. <i>Cupressus arizonica</i> Greene.	Аризонский кипарис	Cupressaceae подс. Cupressineae	Сев. Америка
87. <i>Cupressus Caschmeriana</i> Roybe	Кашмирский кипарис	»	Индостан
88. <i>Cupressus funebris</i> Endl.	Траурный кипарис	»	Китай
89. <i>Cupressus Goveniana</i> Gord.	—	»	»
90. <i>Cupressus Gwadalupensis</i> Wachs.	Гвадалупский кипарис	»	Гвадалупа
91. <i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	Лузитанский кипарис	»	Сев. Америка
92. <i>Cupressus lusitanica</i> v. <i>Benthami</i> Carr.	Лузитанский кипарис	»	»
93. <i>Cupressus lusitanica</i> f. <i>glauca</i>	Голубая ф. кипариса	»	Сад. форма
94. <i>Cupressus lusitanica</i> v. <i>Lindleyana</i>	Кипарис Линдлея	»	Сев. Америка
95. <i>Cupressus Macnabiana</i> Murr.	Кипарис Макнаба	»	Калифорния
96. <i>Cupressus Macrocarpa</i> Gord.	Кипарис крупноплодный	»	»

Место нахождения в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 35, 26	4	I	Цвет.	Нет	
12 натур. пункта	8	I	»	I	
№ 18, 16	4	I	»	II	
№ 18, С, 16	6	I	Не цвет.	II	
№ 18, 35, С	4	I	Цвет.	II	
21 натур. пункт	52	I, 3, II	»	II	
№ 35	1	I	Плод.	Натур.	
№ 18	1	II, 3, III	Цвет.	»	
№ 36, 13, 12, 17, 19, 21, 26, 31, 32	>100	I	Плод.	I	
№ 18, 5, С	8	I	»	II	
№ 18, 19, 35, 20	5	I, 3, III	»	Нет	
По всему району 32 пункта	∞	I	»	I	
№ 18, 35, С	> 25	I	»	II	
№ 18, 30, 3, С	10	I	»	I	
№ 18, 35, 19, 17, 13, 5, 8, С	> 50	I	»	II	
№ 18, 35, С, X	> 20	I	»	II	
№ 18, 19, С, 12, 11, 15	12	I	»	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
97. <i>Cupressus pygmaea</i> Sargent (?)	Кипарис карликовый	Cupressaceae подс. Cupressineae	Калифорния
98. <i>Cupressus Sempervirens</i> L. v. <i>horisontalis</i>	Кипарис горизонт.	»	М. Азия
99. <i>Cupressus Sempervirens fastigiata</i> , D. C.	Кипарис пирамидальн.	»	»
100. <i>Cupressus torulosa</i> Don	Кипарис непальский	»	Непал
101. <i>Juniperus chinensis</i> L. (<i>mascula</i> u. <i>femina</i>)	Китайский можжевельник	Cupressaceae подс. Juniperineae	Китай, Япония
102. <i>Juniperus chinensis argentea variegata</i> hort.	Серебристо-пестрая ф. кит. мож.	»	Сад. форма
103. <i>Juniperus chinensis variegata</i> hort.	Золотисто-пестр. ф. кит. мож.	»	»
104. <i>Juniperus communis</i> L.	Обыкновенный можжевельник	»	Европа
105. <i>Juniperus drupacea</i> Labill	Костянковый можжевельник	»	М. Азия
106. <i>Juniperus Excelsa</i> March.	Древовидный можжевельник	»	Кавказ
107. <i>Juniperus procumbens</i> Sieb.	Стелющийся можжевельник	Cupressaceae подс. Juniperineae	»
108. <i>Juniperus Sabina</i> L.	Можжевельник казацкий	»	Крым, Кавказ, Туркестан
109. <i>Juniperus Virginiana</i> L.	Виргинский можжевельник	»	Сев. Америка
110. <i>Juniperus Virginiana glauca</i> Carr.	Голуб. разновид: вирг. мож.	»	Сад. форма
111. <i>Juniperus Virginiana polymorpha</i> .	Разнолистн. форма вирг. мож.	»	»
112. <i>Juniperus Bermudiana</i> L. (?)	Можжевельник Бермуда	»	»

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
№	6	7	8	9	10
№ 18 (?)	2	I	Цвет.	Нет	
По всему району	∞	I	Плод.	I	
По всему району	∞	I	»	I	
№ 18, 19, 13, 5, 35, 28, 26	18	I	»	I	
№ 18, 19, 35, 33, 21, 22, 10, 15, 12, 10, 17, С, X, 26	>50	I	»	I	
№ 18, А ¹ , 15, 17, 35	18	I	Цвет.	I	¹ Дача б. Кукаш
№ 18, 19	4	I	Не цвет.	II	
№ 18, 21, 15, 9, 12, 16, 17, С	11	I	Плод.	Нет	
№ 18 ¹ , 35	2	I, 3, IV	Цвет.	Натур.	¹ Погибло от за- сухи 1928 г.
№ 18, 35, 13	5	I	Плод.	II	
№ 35, 13	2	I	Цвет.	Нет	
№ 18, 16, 17, 35, 11, 12, 6, 1, С	>25	I	Плод.	II	
№ 18, 35, 13, 10, С, 17, 26, 30, 29	>14	I	»	I	
№ 17, 18, 19, 13, 35, 29, 30, С, 12	12	I	»	I	
№ 35	1	I	»	Натур.	
№ 35, 18, 13	4	I	Не цвет.	»	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
113. <i>Juniperus species</i>	—	Cupressaceae подс. Juniperineae	Сад. форма
114. <i>Keteleeria Fortunei</i> Carr.	Кетелеерия Фор- туна	Pinaceae подс. Abietineae	Китай
115. <i>Larix leptolepis</i> Gord.	Японская лист- венница	»	Япония
116. <i>Larix europea</i> DC	Европейская ли- ствен.	»	Центр. Евр.
117. <i>Libocedrus chilensis</i> Endl.	Речной чилль- ский кедр	Cupressaceae подс. Cupressineae	Чили
118. <i>Libocedrus decurrens</i> Torr.	Калифорнский ладан. кедр	»	Южн. Ка- лиф.
119. <i>Picea ajanensis</i> Fisch	Ель аянская	Pinaceae подс. Abietineae	Япония
120. » <i>alba</i> Link	» белая	»	Канада, Аляска
121. » <i>Engelmannii</i> Eng.	Белая ель Энгель- мана	»	Соед. Шта- ты
122. » <i>excelsa</i> Link.	Ель обыкновен- ная	»	Зап. Европа и Европ. часть СССР
123. » » <i>finedo- nensis</i> H.	—	»	Сад. форма
124. <i>Picea excelsa</i> Hender- soni	—	»	»
125. <i>Picea excelsa reflexa</i> Carr.	—	»	»
126. <i>Picea excelsa pendula</i> Jacq. et Hér.	Плакуч. форма обыкн. ели	»	»
127. <i>Picea excelsa pumila</i> hort.	Карликов. форма ели обыкн.	»	»
128. <i>Picea excelsa inversa</i> hort.	—	»	Зап. Европа и Европ. часть СССР

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Патуралннц. пункты	Кол. экз.				
б	6	7	8	9	10
№ 18, 35	4	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 35, 33, 11	6	I, 3, III	Плод.	Нет	
№ 35	1	I	Цвет.	»	
С	2	I	»	»	
№ 18, 16	3	I	»	II	
10 натур. пунктов	>100	I	Плод.	I	
№ 17, 18, 26	7	I, 3, II	»	Нет	
№ 18, Б, 6, С, 26, 17, 35	> 50	I	»	II	
№ 18	1	I	Не цвет.	Нет	
24 натур. пункта	>100	I	Плод.	II	
№ 18, 35	4	I	Цвет.	Нет	
№ 35, С	2	I	»	»	
№ 18, 17, С	5	I	»	II	
№ 18, 35, 32, X, С	7	I	»	II	
С, 18, 35	5	I	Не цвет.	Нет	
—	—	—	—	—	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
129. <i>Picea excelsa viminalis</i> Casp.	Форма обыкнов. ели	Pinaceae подс. Abietineae	Садовая форма
130. <i>Picea excelsa viridis</i> hort.	—	»	»
131. <i>Picea excelsa aurea</i> P. Smith	—	»	»
132. <i>Picea excelsa Columnaris</i> Carr.	—	»	»
133. <i>Picea excelsa Conica</i> Carr.	—	»	»
134. <i>Picea excelsa inversa</i> hort.	—	»	»
135. <i>Picea excelsa Maxwelli</i> hort.	—	»	»
136. <i>Picea excelsa nana compacta</i> hort.	—	»	»
137. <i>Picea excelsa robusta</i> hort.	—	»	»
138. <i>Picea Morinda</i> Lk.	Слезящаяся или мориндовая ель	»	Гималаи
139. <i>Picea nigra</i> Linc.	Черная ель	»	Сев. Амер.
140. <i>Picea nigra Mariana</i> hort.	Низкая ф. черной ели	»	Сад. форм
141. <i>Picea obovata</i> Ledeb.	Сибирская ель	»	Сибирь
142. » <i>Omorica</i> Panc.	Сербская ель	»	Сербия
143. » <i>Orientalis</i> Carr.	Восточная ель	»	Закавказье
144. » <i>polita</i> Carr.	Колючая ель	»	Япония
145. » <i>pungens</i> Engelm.	Синяя ель	»	Колорадо
146. » <i>rubra</i> Lnk.	Красная ель	»	Сев. Амер.
147. » <i>Sitchensis</i> Carr.	Ситханская ель	»	»
148. » <i>Alcockiana</i> Carr.	Алькоковая ель	»	Япония
149. » <i>hondoensis</i> Mayr.	—	»	»
150. » <i>Wilsonii</i> Mast.	Ель Вильсона	»	Китай
151. » <i>Sargentiana</i> Rehd.	Ель Сержента	»	Сев. Амер.
152. <i>Pinus australis</i> Michx.	Сосна австралийская	Pinaceae подс. Abietineae	»

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Патурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35	3	I	Цвет.	Нет	¹ Дача б. Горинова
№ 6, 18, 35, 17	6	I	»	»	
№ 18, 26, С	3	I	»	II	
№ 18, 17 ¹	4	I	»	II	
№ 30, 1, 2	3	I	»	Нет	
№ 18	1	I	»	»	
№ 18, 35, С	7	I	Не цвет.	II	
№ 11, 12, 35	3	I	»	II	
№ 18, 35	3	I	Цвет.	Нет	
22 натур. пункта	>50	I	Плод.	I	
№ 35, 15	8	I	»	Нет	¹ Д. б. Кривцова ² Д. б. Горинова
№ 35, С.	3	I	Не цвет.	II	
№ 1, 8, 30	3	I	Цвет.	Нет	
№ 18	2	I	Плод.	»	
№ 18, 21, 17, 26, 29	>25	I	»	I	
№ 18, 10, 34, X ¹ , 17 ²	8	1, 3, III	»	II	
21 натур. пункт	>50	I	»	I	
№ 18, 35, 19, 2	8	I	»	Нет	
№ 33, 11, 21, 24, 1, 5, 6, 30, 17, 18, 26, С	>50	I	»	II	
№ 18	2	I	»	Нет	
№ 18	4	I	»	Натур.	
№ 18, 35	2	1, 3, II	»	Нет	
№ 18,	2	I	»	»	
№ 18, 19, 11, 20, 1, 17, X, С. 35	21	I	Цвет.	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
153. <i>Pinus Ayacahuite</i> Ehrend (Syn. <i>Bonapartea Aoere</i>)	Сосна Бонапарта	Pinaceae подс. Abietineae	Мексика
154. <i>Pinus Banksiana</i> Lamb.	» Банкзиева	»	Сев. Амер.
155. » <i>brutia</i> , Ten.	—	»	Мал. Азия
156. » <i>Bungeana</i> Zucc	» Бунгиза	»	Сев. Китай
157. » <i>Contorta</i> Dougl.	» кривая	»	Сев. Амер.
158. » » var. <i>Murrayana</i>	Черная сосна	»	Аляска
159. <i>Pinus Coulteri</i> Don.	Сосна Культера	»	Сев. Амер.
160. » <i>densiflora</i> Sieb. et Zucc.	Красная японская сосна	»	Япония
161. » <i>Cembra</i> L.	Западноевропей- ский кедр	»	Зап. Европа
162. » <i>excelsa</i> Wall.	Гималайская сосна	»	Гималаи
163. » <i>Greggii</i>	Сосна Грегга	»	Сев. Амер.
164. » <i>insignis</i> Dougl.	Сосна величест- венная	»	Калифорния
165. » <i>halepensis</i> Mill	Сосна алепская или иерусалим- ская	»	Средиз. море
166. » <i>Laricio</i> Polr.	Сосна черная	»	Альпы, Кар- паты
167. » » <i>austriaca</i>	Сосна австрий- ская	»	То же
168. » » <i>Calabrica</i> Delam.	Сосна калабрий- ская	»	Средиз. море
169. » » <i>Pallasiana</i> Endl.	Крымская сосна	»	Крым
170. » <i>longifolia</i> Roxb.	Длиннохвойная сосна	»	Гималаи
171. » <i>mitis</i> Michx.	—	»	Сев. Амер.
172. » <i>montana</i> Mill	Горная сосна	»	Горы Зап. Европы
173. » <i>monticola</i> Dougl.	—	»	Америка
174. » <i>muricata</i> Dow.	Сосна коротко- хвойная	»	Калифорния
175. » <i>Parryana</i> Engelm.	Сосна четырех- хвойная	»	»
176. » <i>patula</i> Schlecht. A. Cham.	—	»	—

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Патурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
18, 13, 15, 20, 34, С	11	I	Плод.	II	
№ 18	1	I	»	Нет	
№ 18, 19	2	I	Цвет.	»	
№ 18, 17 ¹	5	I	Плод.	I	¹ Дача Горина и Филатова
18, 11, С ¹ , 13, 2	10	I	»	Нет	¹ Дача Леви — Новые Сочи
№ 13, 2	2	I	»	»	
№ 18, 2, 4, 17 ¹ 32, 31, 20	12	I?	»	»	¹ Дача № 70 СМК
18, 33, 11, 34, 9, 5, 17 ¹ , 35	>24	I	»	»	¹ д. 70СМК сан. Светлана и Элит
№ 18, 35	2	1, 3 ¹	Не цвет.	»	¹ В Адлере погиб один экз. от за- сухи
По всему району	∞	I	Плод.	I	
№ 18	2	I	»	Нет	
По всему району	∞	I	»	I	
№ 18, 19, 35, 12	>10	I	»	Нет	
№ 8, 1, 27, 35, 30 ¹	>10	I	»	»	¹ Сюда включены только сомнит. экземпл.
№ 18, 35, 19, 27, 11, 22, 10, 20, 33, 9 (всего 26 п.)	22	I	»	II	
№ 19, 18, 35, 2, 7, 8	∞	I	»	II	
25 пункт. района	>20	I	»	II	
№ 19, 10, 20, 30, Х ² , 28, С ³ , 35	∞	I	»	II	² Дача б. Крив- цова
№ 18, 11, 10, 24, 9, 17 ⁴ , С ⁵ 17 пунктов	21	I	Цвет.	II	³ Дом Нагорная 5, Комсомольская, 18, Печор. 7
№ 19, 28, С ⁶	29	1, 3, III	Плод.	Нет	⁴ Сан. Розы Люк- сембург
№ 18, 19, 17 ⁷ , С ⁸	68	I	»	»	⁵ Дача б. Годзи
№ 18	4	I	»	»	⁶ Д. б. Мухина
№ 18	16	1, 3, IV	»	»	⁷ Сан. Розы Люк- сембург, сан. № 7
№ 18	1	1, 3, IV	Цвет.	»	⁸ Дача б. Мамон- това
№ 18	1	II, 3	»	»	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
177. <i>Pinus peuce</i> Griseb.	Румелийская сосна	Pinaceae подс. Abietineae	Македония
178. » <i>Pinaster</i> Sol.	Приморская сосна	»	Средиз. мор.
179. » » var. <i>Hamiltonii</i> , Pall.	Сосна Гамильтона	»	»
180. <i>Pinus Pinea</i> L.	Итальянская сосна	»	Сред. и Черном. обл.
181. » <i>Pithyusa</i> Strangw.	Пицундская сосна	»	Закавказье
182. » <i>ponderosa</i> Dougl.	Сосна орегонская	»	Калифорния
183. <i>Pinus ponderosa</i> var. <i>scopulorum</i> , Engl.	Короткохвойные разн. сосны	»	»
184. <i>Pinus rigida</i> Mill.	Смолистая или прямохвойн. сосна	»	Сев. Амер.
185. » <i>Sabiniana</i> Dougl.	Сосна Сабина	»	Калифорния
186. <i>Pinus Strobus</i> L.	Веймутова сосна	»	Америка
187. » <i>Silvestris</i> L.	Обыкновенная сосна	»	Сев. часть Союза
188. » <i>Taeda</i> L.	Сосна ладанная	»	Флорида
189. » <i>Thunbergii</i> Parl.	Японская черная	»	Япония
190. » <i>tuberculata</i> Gord.	Сосна бугристая	»	Калифорния
191. » <i>Jeffreyi</i> Murr.	Сосна Жефрея	»	»
192. <i>Podocarpus chinensis</i> Wall.	Подокарпус китайский	Таксеее подс. Podocarpeae	Китай
193. <i>Podocarpus macrophylla</i> D. Don.	Крупнолистный подокарпус	»	Япония
194. <i>Podocarpus Nageia</i> R. Br.	Подокарпус Негеи	»	»
195. <i>Pseudolarix Kaempferi</i> Gord.	Лжелиственница Кемпфера	Pinaceae подс. Abietineae	»
196. <i>Pseudotsuga Douglassii</i> Carr.	Дугласова пихта	»	Сев. Амер.
197. <i>Pseudotsuga glauca</i> Mayr.	Голубая ф. дуглас. пихты	»	»
198. <i>Pseudotsuga macrocarpa</i> Mayr.	Крупноплодная пихта	»	Южн. Калифорния

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примсчание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 19, 18, 35, 11	9	I	Цвет.	Нет	
По всему району (33 пункта)	—	I	Плод.	I	
№ 18, 19, 35	>10	I	»	II	
30 пунктов	∞	I	»	II	⁹ По откосам п. № 30 и ст. Уч-дере и Лоо
122 пунктах рай- она, а также дико ⁹	∞	I	»	II	¹⁰ Светлана и Элит
№ 18, 19, 17 ¹⁰ , 35	>25	I	»	II	¹¹ Д. отдыха ЦКПроса
№ 18, 10, 2, 17 ¹¹ , C ¹² , 11	10	I	»	II	¹² Дача. б. Годзи и Ванновского
№ 18, 20, 17 ¹³ , 30	13	1, 3, II	»	Нет	¹³ Дом 70 СМК. Светлана и Элит и сан. Розы Люк- сембург
№ 18, 10, 15, 20, 2, 31, X ¹⁴ , C ¹⁵	>30	I	»	I	¹⁴ Д. б. Кривцова
22 натур. пункта	>100	I	»	I	¹⁵ Д. б. Нович- кова, Нагорная, 5
№ 18, 35	8	I	»	Нет	
№ 18, 10, 17 ¹⁶ , C, 26	26	I	»	II	¹⁶ № 7 ОСМК, д. отдыха ЦКПрос
№ 18, 19, 35, 9, 10, 8, 2, 30, 17	35	I	»	Нет	Санат. Розы Люксемберг,
№ 19	1	I	»	»	Элит
№ 18, 20	3	I	Не цвет.	»	
№ 18	2	I	»	»	
№ 18, 10, 30, 12, 16, 26, C ¹ , 17 ²	16	I	Плод.	II	¹ Санат. «Красная Москва»
№ 18	2	1, 3, II	Цвет.	Нет	² Дом от. ЦКПроса
№ 18, 35	2	I	»	Натур.	
22 натур. пункта	<50	I	Плод.	I	
№ 18, 30, 31, 17 ³ , C	9	I	Цвет.	II	³ Д. б. Горинова
№ 18, 17 ⁴	2	I	»	Натур.	⁴ Д. б. Горинова

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
199. <i>Scyadopytys verticillata</i> Sieb. et Zucc.	Зонтичная сосна	Pinaceae подс. Taxodiaceae	Япония
200. <i>Sequoia gigantea</i> Torr.	Гигантская секвоя	»	Калифорнии
201. » <i>sempervirens</i> Endl.	Секвоя тиссо-видная	»	Сев. Амер
202. <i>Taxodium distichum</i> Rich.	Болотный кипарис	»	»
203. <i>Taxodium intermedium</i> Garr.	»	»	»
204. <i>Taxus baccata</i> L.	Красное дерево, Тисс	Taxaceae	Европа
205. » » f. <i>hibernica</i>	Тисс колонновидный	»	Сад. форм
206. <i>Taxus baccata</i> f. <i>nana</i> Knight.	Тисс низкий	»	»
207. <i>Taxus baccata</i> f. <i>Dovastonii</i> Carr.	Тисс Довастона	»	»
208. <i>Taxus baccata</i> f. <i>adpressa</i> Carr.	—	»	»
209. <i>Taxus Canadensis</i> Willd.	Канадский тисс	»	Канада
210. <i>Thuja gigantea</i> Nutt. (<i>Thuja plicata</i> Don.)	Гигантская туя	Cupressaceae подс. Thujopsudineae	Калифорнии
211. <i>Thuja gigantea</i> v. <i>pyramidalis</i>	Пирамидальная ф. гигант. туи	»	Сад. форм
212. <i>Thuja gigantea</i> v. <i>elegantissima</i>	Изящная ф. гигант. туи	»	»
213. <i>Thuja occidentalis</i> L.	Западная туя	»	Сев. Амер
214. » » <i>asplenifolia</i> hort.	—	»	Сад. форм
215. <i>Thuja occidentalis aurea variegata</i>	Золот. ф. вост. туи	»	»
216. <i>Thuja occidentalis columbiana</i> hort.	—	»	»
217. <i>Thuja occidentalis</i> Knight.	Туя западная компактная	»	»
218. <i>Thuja occidentalis cristata</i> hort.	Туя кристата	»	»
219. <i>Thuja occidentalis ericoides</i> hort.	Туя вересковидная	»	»

* По наблюдениям в парках. Дико в лесах хорошо плодоносит и да

Местонахождение в районе		Морозо- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
18, 23, 22, 8, 2, 16	10	I	Плод.	I	
1 натур. пунктов 18, 21, С ¹ , 2, 20, 17, 26, 35	>100 36	I 1, 3, III	Цвет. Плод.	II 1, II	¹ На строитель: ст. санатор. на 3-й версте
18, 23, 30, 2, 21, 16 ² , 35 № 18	22 1	I I	» Цвет.	II Нет	² Участок б. Цвет- ков
№ 18, 35, 29	3	I	Не цвет.*	»	³ Д. б. Кривцова и Юрковского
18, 19, 16, 32, 21, Х ³ , 26, С ⁴	>50	I	Плод.	I	⁴ 10 садов по Сочи
16, 32, 2, С, 35 № 35	5 3	I I	Цвет. Плод.	Нет »	
№ 35	10	I	»	»	
№ 18, 35	>10	I	Цвет.	»	
По всему району	<100	I	Плод.	I	
№ 18, 35	3	I	»	II	
№ 18, 35, 16	>10	I	Цвет.	II	
1 натур. пунктов	>50	I	Плод.	Нет	
№ 18, 35	4	I	Цвет.	II	
18, 35, 19, 13, 12, 15, 30	14	I	»	I	
№ 18, 35	5	I	»	II	
18, 35, 29, 19, 13, 15	>25	I	»	I	
№ 18, 35, 16	6	I	»	II	
18, 35, 16, 17	>15	I	»	II	

МОСВ.

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
220. <i>Thuja occidentalis</i> Howeyi hort.	Туя Говся	Cupressaceae подс. Thujopristi- neae	Сад. фор
221. <i>Thuja occidentalis</i> pyramidalis Ten.	Пирамид. ф. зап. туи	»	»
222. <i>Thuja occidentalis</i> recurva nana hort.	—	»	—
223. <i>Thuja occidentalis</i> Rosenthalii Ohlend.	Туя Розенталь	»	Сад. фор
224. <i>Thuja occidentalis</i> Späthi p. Sm.	» Шпета	»	»
225. <i>Thuja occidentalis</i> Wareana Beissn.	» Варейна	»	»
226. <i>Thuja orientalis</i> , L. (<i>Biota orientalis</i> Enell.)	» восточная	»	Япони
227. <i>Thuja orientalis</i> v. compacta	» восточная компактная	»	»
228. <i>Thuja Standishii</i> Can (Syn. <i>T. japonica</i>)	Туя японская	»	»
229. <i>Thujopsis dolobrata</i> Sieb. et Zucc.	Японский туевик «Хиба»	Cupressaceae п. дс. Thujopsidi- neae	»
230. <i>Thujopsis dolobrata</i> variegata hort.	Японский туевик пестролист.	»	Сад. фор
231. <i>Thujopsis dolobrata</i> nana Sieb. et Zucc. (Syn. <i>laetevirens</i> Lindl.)	Японский туевик низкий	»	»
232. <i>Torreya californica</i> Torr.	Калифорнская торея	Taxaceae подс. Taxeae	Калифо ния
233. <i>Tsuga canadensis</i> Carr.	Канадская цуга	Pinaceae подс. Abietineae	Канад
234. » <i>Seboldii</i> Carr.	Цуга Сибольда	»	Япони
235. » <i>Canadensis</i> v. <i>pendula</i> hort	Плакучая форма канадск. цуги	»	Китай

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35	5	I	Цвет.	II	
№ 35	2	I	»	II	
№ 18, 35, 19, 13, 23	> 10	I	»	I	
№ 35	2	I	»	Нет	
№ 18, 35, 17, 16, 29, С	> 15	I	»	I	
16 пунктов	> 20	I	»	II	
№ 18, 35, 13, С	> 20	I	Плод.	Нет	
14 пунктов	∞	I	»	I	
№ 18, 35	3	I	»	II	
№ 10, 35, 5, С	12	I	»	II	
23 пункта	> 50	I, 3, III	»	I	
№ 16 ¹ , 17 ²	2	I	Не цвет.	Натур.	¹ Верещагинский парк.
№ 18, 10	2	I, 3, III	»	—	² Дом от. ЦК Про- са.
17 пунктов	> 50	I	Плод.	II	
№ 18, 21, 30, 35	6	I	»	I	
№ 18	1	I	Не цвет.	Нет	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
Под'отдел. Angiospermae	Покрытосемяные лиственные породы ¹	—	—
1. Abelia floribunda Desne.	Абелия	Caprifoliaceae	Китай, Япония
2. Abutilon megapotamicum St. Hill. (A. vexillarium)	Абутилон	Malvaceae	Бразилия
3. Abutilon Sellovianum	» Селловiana	»	Юж. Америка
4. » Crisostephonum	Абутилон кризостефонум	»	»
5. » hybridum compactum	Абутилон гибридный	»	Гибриды
6. Abutilon Begnellii stress.	Абутилон Бегнелли	»	Юж. Америка
7. Acacia cultriformis, A. Cunn.	Акация культриформис	Leguminosae	Юж. Австралия
8. Acacia dealbata Link.	Мимоза, акация деальбата	»	Австралия
9. » Farnesiana Willd	Акация фарнезиана	»	»
10. » longifolia Willd	Акация длинолистная	»	»
11. » melanoxylon R. Bi.	Акация чернодревесная	»	»
12. » Saligna Wendl.	Акация солигна	»	»
13. » deccurrens Benth.	» деккурренс	»	»
14. Acer dasycarpum Ehrh.	Клен серебристый	Aceraceae	Сев. Америка
15. » insigne Boissier u. Buhse	Клен величественный	»	Закавказье
16. Acer japonicum Thunb.	Японский клен	»	Япония
17. » laetum CA. Mey.	Клен колхидский	»	Закавказье
18. » Negundo L.	Американский клен	»	Сев. Америка

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	¹ Для удобства все лиственные по- роды расположе- ны по алфавиту
19 натур. пунктов	>100	I	Цвет.	I	
№ 18, 35	> 15	I—II	»	I	
№ 18	2	III	»	Нет	
№ 18	1	IV	Не цвет.	»	
№ 18, 35	3	III	»	»	
№ 18	2	IV	»	»	² В холодные зимы через 15—18 д. обмерзает до шейки корня (IV)
№ 18	2	IV	Цвет.	»	
24 натур. пункта	∞	II ²	Плод.	I	
№ 18	1	IV	Не цвет.	Нет	
№ 18	2	IV	»	»	
№ 18, 35, 34	15	III—IV	Цвет.	»	
№ 18	2	IV—V	Не цвет.	»	
№ 18	1	IV—V	»	»	
№ 13	2	I	Цвет.	»	
№ 13	6	I	Плод.	II	
№ 13, 8	4	I	Цвет.	Нет	³ Д. б. Кривцова ⁴ Д. б. Неведом- ского
№ 29, 21, 32, 1 ¹	5	I	Плод.	»	
№ 13, 33, 25, 8, 2, X ³ , 20, Мацеста ⁴	9	I	»	»	

Наименование растений		Семейство
Латинское	Русское	
1	2	
19. <i>Acer Negundo argenteo-variegatis</i>	Серебристая ф. ам. клена	Aceraceae
20. <i>Acer Palmatum</i> Thunb.	Клен вееролистн. дланевидн.	»
21. » » <i>atropurpureum</i> hort.	Клен веер. пурпуров.	»
22. <i>Acer Palmatum</i> var. <i>Thunbergii</i> sub— <i>Septemlobum</i>	Садовая ф. веер. клена	»
23. <i>Acer Palmatum</i> var. <i>dissectum</i> Koch.	Разрезнолистная ф. веер. клена	»
23a. <i>Acer Platanoides</i> L.	Платанолистный клен	»
24. <i>Acer Platanoides globosum</i> Nicholson	Шаров. ф. обыкн. клена	»
24a. <i>Acer Pseudoplatanus</i> L.	Явор	»
25. <i>Acer Pseudoplatanus</i> <i>Nizeti</i> Makoy.	Клен Ницети	»
26. <i>Acer Saccharum</i> Marshal	Сахарный клен	»
27. <i>Aesculus Hippocastanum</i> L.	Конский каштан	Hippocastanaceae
28. <i>Aesculus octandra</i> Morsh.	» каштан желтый	»
29. » <i>Pavia</i> L.	Конский каштан красноцвет.	»
30. » » <i>folis variegatis</i>	Пестролистная ф. конск. каштана	»
31. <i>Aesculus rubicunda</i> Loise. (<i>A. Hip.</i> × <i>A. Pavia</i>)	Конский каштан бастардный	»
32. <i>Agave americana</i> L.	Американская агава	Bromeliaceae
33. » » var. <i>mexicana</i> hort.	Мексиканская агава	»
34. <i>Agave americana</i> v. <i>aurea</i>	Золотистая агава	»

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 17, С ¹ , 18, 8, 4, 5, 30, 11	8	I	Цвет.	—	¹ Комсомольск., 14
№ 33, 21, 9, 8, 13, 29, 20, 17	> 50	I	Плод.	II	
№ 13, 17, 8	4	I	Цвет,	II	
№ 13, 29	3	I	»	II	
№ 13, 17 ²	4	I	»	II	² Д. о. ЦКПроса
№ 18, 10, 2, 26	6	I	Плод.	Нет	
№ 18	1	I	»	»	
№ 10, 2	2	I	»	»	
№ 35	1	I	»	II	³ По улицам г. Со- чи
№ 18	1	I	»	Нет	
№ 29, 25, 13, 30, 20, 29, 17, 18, 35, 19, С *	> 50	I	»	I	
№ 13, 18	3	I	»	Нет	
№ 18, 13, 22	5	I	Цвет.	»	
№ 18	2	I	»	»	
№ 13	1	I	»	»	
18 натур. пунктов	> 100	I—II	Плод.	I	
№ 18, 35, 19, 21, С, 11, 12	¹² > 25	I—II	»	II	
№ 18, 19, 21, С, 11, 13, 12	11	I—II	»	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
35. <i>Agave ferox</i> Koch.	Колючая агава	Bromeliaceae	Мексика
36. » <i>horrida</i> Lem.	Агава хоррида	»	»
37. » <i>Salmiana</i> Otto	» сальмиана	»	»
38. » <i>Xylonacantha</i> Salw.	Деревянистоко- лючая агава	»	»
39. <i>Agave Applanata</i> Lem.	Агава аппланата	»	»
40. <i>Ailantus glandulosa</i> Dest.	Айлант-китайский ясень	Simarubaceae	Китай
41. <i>Albizzia Julibrissin</i> . Boiv.	Шелковая акация	Leguminosae	М. Азия
42. <i>Akebia quinata</i> DC. Thunb.	Акация пятилист- ная	Lardizabala- ceae	Китай, Япо- ния
43. <i>Aleurites cordata</i> R. Br.	Тунговое дерево	—	»
44. <i>Amorpha fruticosa</i> L.	Аморфа кустар- ная	Leguminosae	Сев. Америка
45. <i>Anona triloba</i> L.	Анона трехло- пастная	Anonaceae	Юж. Америка
46. <i>Aralia papyrifera</i> Hook.	Аралия бумажная	Araliaceae	Остр. Формоза
47. » <i>Sieboldii</i> Hort.	» Зибольда	»	Япония
48. » <i>Spinosa</i> Lin.	» колючая	»	Сев. Америка
49. <i>Arbutus Andrachne</i> L.	Кавказск. земля- ничн. дерево	Ericaceae	Крым, Кавказ.
50. » <i>Unedo</i> L.	Земляничник	»	Юж. Европа
51. <i>Arundinaria Simoni</i> Riv.	Арундиная Си- мона	Gramineae	Вост. Азия
52. <i>Arundo Donax</i> L.	Арундо донакс	»	Средиземн. морск. об.
53. <i>Aucuba japonica</i> L.	Зеленое дерево	Cornaceae	Япония
54. » » <i>picta</i> Hort.	Мраморное де- рево	»	Сад. форм.

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35, 21, 17, 16	8	I—II	Плод.	II	
№ 18	1	III	Не цвет.	Нет	
№ 18, 21, 12, 11, 30, X, C	> 25	I—II	Плод.	II	
№ 18	2	I—II	Не цвет.	Нет	
№ 18, 15, 19, 17	5	II	»	»	
№ 9, 35, A ¹ , C ² , 3, 6, 30, 19, 18	> 100	I	Плод.	I	¹ Заросли в го- родск. парке
По всему району (32 пункта)	> 100	I—3—III	' »	I—II	² Во многих домах города
№ 18	5	I—II	Цвет.	II	
№ 11, 18	> 25	II	»	Натур.	
№ 19, 16, 20, 29, 17, C ¹	> 100	I	Плод.	II	
№ 18	3	II—IV	Не цвет.	Натур	
№ 18, 12, 35	> 25	II—IV	Цвет.	Нет	
№ 18, 12, 33, 17, 16, C ¹	> 50	I—III	»	I	¹ Комсомольск., 19
№ 18, 35, 16, 29 ²	> 25	I	»	II	² Целяя заросль
№ 18	3	I	Плод.	Нет	
24 пункта	> 50	I	»	I	
№ 18, 13, 30, 16, 20, C ³	За- росл.	I	Не цвет.	Нет	³ Комсомольск. 19
№ 18, 15, 4, 30, 17 6	груп	II—IV	»	Нет (II)	
№ 18, 13, 22, 16, X ⁴ , 19	9	I—II	Плод.	I	⁴ Д. б. Новицкого
№ 18, 19, 35	5	I—II	»	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
55. <i>Azalea indica</i> L.	Индийская азалия	Ericaceae	Китай
56. » <i>mollis</i> Bl.	Азалия мягкая китайская	»	Китай, Япония
57. » <i>pontica</i> L.	Азалия кавказская	»	Кавказ
58. <i>Arauja cericofera</i> Brot.	Арауния церикофера	Asclepiadaceae	Бразилия
59. <i>Ardisia japonica</i> Thunb.	Ардизия японская	Myrsinaceae	Япония, Китай
60. <i>Baccharis halimifolia</i> L.	Баххарис халими- фолия	Plumbaginaceae	Сев. Амер.
61. <i>Bambusa quadrangularis</i> Fenz.	Бамбук квадратный	Compositae	Япония
62. <i>Bambusa nitida</i>	Бамбук блестящий	Gramineae	»
63. » <i>Verticillata</i> w.	Бамбук мутовчатый	»	»
64. » <i>Sp.</i>	Бамбук неизвестный	»	»
65. » <i>scriptoria</i> Den.	Бамбук скриптория	»	»
66. <i>Benthamia fragifera</i> Ldl.	Клубничное дерево	»	»
67. <i>Berberis vulgaris</i> L.	Барбарис обыкновен., кислица	Cornaceae	Япония, Индия
68. » <i>canadensis</i> Mill.	Барбарис канадский	Berberidaceae	Европа
69. » <i>Wallichiana</i> DC.	Барбарис Валиха	»	Сев. Амер.
70. <i>Beschöneria juccoides</i> Hook.	Бешернерия юковидная	»	»
71. <i>Betula pubescens</i> Erhr.	Береза пушистая	Amaryllidaceae	Мексика
72. » <i>pendula purpurea</i> hort.	» пурпуровая	Betulaceae	Европа, Азия
		»	»

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18	7	I—II	Цвет.	II	Плоды мною со- бирались в 1928 г. Качество семян неизвестно.
№ 35	2	I	Плод.	Нет	
№ 18, 35, С, Х, и дико	∞	I	»	II	
№ 18	1	II—IV	»	Натур.	
№ 18, 19, 35	6	I—III	Цвет.	»	
№ 18, 26, 35	6	I	»	II	
№ 18, 35	—	II—III	Не цвет.	Нет	
№ 18	—	III	»	»	
№ 18	—	II—III	»	»	
№ 18	—	I—II	»	»	
№ 18, 35	—	II—III	»	Натур.	
№ 19, 18, 35	12	I	Плод.	I	
№ 13, 2, 1, 30, С	7	I	»	Нет	
№ 35, 13	2	I	Цвет.	»	
№ 18	1	?	»	Натур.	
№ 18, 35, 19	5	I	»	II	
№ 35, 21, 9, 13, С	6	I	Плод	Нет	
№ 35	2	I	»	»	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
73. <i>Boehmeria nivea</i> Hook. et Arnott.	Бомерия нивея	Urticaceae	Вост. Азия Китай
74. <i>Boussingaultia basilloides</i> Kuntz.	Буссенгольция базилоидес	Chenopodiaceae	Юж. Амер.
75. <i>Brahea dulcis</i> Mart.	Брагея сладкая	Palmae	Мексика, Перу, Теха
76. » <i>Roezli</i> hort.	» голубая	»	Сев. Амер. Калифорн.
77. <i>Broussonetia papyrifera</i> Willd.	Бумажная шелковица	Moraceae	Япония
78. <i>Buddleja Lindleyana</i> Fortune	Будлея Линдлея	Loganiaceae	В. Азия
79. <i>Buddleja variabilis</i> Hems.	» изменчивая	»	»
80. <i>Bupleurum fruticosum</i> Linn.	Буплейрум	Umbelliferae	Юж. Европ.
81. <i>Buxus balearca</i> Lamk.	Балеарский самшит	Buxaceae	Балеарские остр.
82. » <i>sempervirens</i> L.	Самшит кавказский	»	Кавказ, Крым, ю.-з. Европа
83. » » <i>albo-marginatus</i>	Самшит белоокаймленный	»	Сад. форма
84. <i>Buxus sempervirens</i> f. <i>latifolia</i>	Круглолистный самшит	»	»
85. <i>Buxus sempervirens</i> f. <i>microphylla</i>	Мелколистный самшит	»	»
86. <i>Buxus sempervirens</i> f. <i>viridis glaucescens</i>	Самшит зелено-блестящий	»	»
87. <i>Buxus sempervirens</i> f. <i>suffruticosus</i>	Самшит полукустарников.	»	»
88. <i>Buxus sempervirens</i> f. <i>Hansvortiensis</i>	Самшит Гансворта	»	»
89. <i>Brachichiton acerifolium</i>	Брахихитон кле-нолистный	Sterculiaceae	Австралия
90. <i>Calycarpa americana</i> L.	Каликарпа американская	Verbenaceae	Каролина

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 19, 35	> 30	II, 3, IV	Цвет.	Нет	
№ 18	1	II—III—IV	Не цвет.	»	
№ 18	1	II	Цвет.	»	
№ 18	2	I—I	»	II	
№ 18, 30, 13, X ¹	5	I	Плод.	I	¹ Дача Кривцова
№ 18, 30, С ² , 12, 31, X ³ , 35	> 25	I—II	Цвет.	II	² Д. б. Красавина Д б. Новичко- вой
№ 18, 35	3	II	»	Натур.	³ Д. б. Кривцова
№ 30	2	I	Плод.	»	
№ 18, 35, X ⁴	> 10	I	»	II	⁴ Дача б. Кривцова
№ 35, 19, С и дико	> 10	I	»	I	
№ 9, 16, 18, 19, 35, 30, X, С	> 50	I	Не цвет.	I	
№ 18, 19, 35, 13, 15, 17, С, X	> 50	I	»	I	
№ 18, 19, 35, 13, 17	> 25	I	»	I	
№ 18 ⁵	2	I	»	Натур.	⁵ Возможно и в других пунктах
№ 18, 35, 13, 17, 16, С	> 25	I	»	II	
№ 18, 35	> 10	I	»	Натур.	
№ 18, 11	2	III—IV	»	Нет	
№ 18	4	I	Плод.	Натур,	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
91. <i>Calycanthus floridus</i> L.	Чашецвет, пряный куст	Calycanthaceae	Каролина
92. » <i>praecox</i> L.	Пахучий химо-нант	»	Япония
93. <i>Camelia japonica</i> L.	Камелия японская	Theaceae	»
94. » <i>sasanqua</i> Thbg.	Камелия сазанква	»	Китай
95. <i>Carmichaelia australis</i>	Кармихелия аустралис	Leguminosae подс. Papilionaceae	Нов. Зеландия
96. <i>Carpinus Betulus</i> L.	Граб обыкновенный	Betulaceae	Зап. Европа
97. <i>Carya aquatica</i> Natt.	Водяной орех	Juglandaceae	Сев. Амер.
98. » <i>amara</i> Nutt. (Syn. <i>C. cordiformis</i> K. Koch.)	Горький орех	»	»
99. <i>Carya alba</i> Nutt.	Насмешливый орех (белый карий)	»	»
100. » <i>olivaeformis</i> Nutt.	Пекан	»	»
101. <i>Quercus glabra</i> Thunb. Syn. <i>Pasania glabra</i>	Дуб блестящий пазания	Fagaceae	Япония
102. <i>Caryopteris Mastacanthus</i> Schan.	Кариоптерис китайск.	Verbenaceae	Китай
103. <i>Cassia floribunda</i> Cav.	Кассия	Cesalpinaceae	Нов. Испания
104. <i>Castanea crenata</i> Sieb. u. Zucc.	Японский каштан «Кури»	Fagaceae	Япония
105. <i>Castanea vesca</i> , Saert. (Syn. <i>C. sativa</i> Mill.)	Съедобный каштан	»	Юж. Европа
106. <i>Casuarina tenuifolia</i>	Казуарина	Casuarinaceae	Австралия
107. <i>Catalpa Syringaefolia</i> Sims.	Катальпа сиренелистная	Bignoniaceae	Америка
108. » » <i>atropurpurea</i> hort.	Катальпа пурпуровая	»	»

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35, 17 ¹ , 30, 29, С ²	> 15	I	Плод.	I	¹ Санат. им. Сталина, д. от. ЦЕК-проса ² Приморская, 24 ³ Д. б. Кривцова ⁴ Сан. им. Сталина
№ 18, 12, 30, 29, 34, 21, X ³ , 17 ⁴	> 25	I	»	I	
22 натур. пункта	> 100	I	Цвет. и плод.	I	
№ 18, 19, 35, 16	9	I	Цвет.	II	
№ 18	1	II?	»	Натур.	
По всему району и дико	∞	I	Плод.	Нет	
№ 19	2	I	»	Натур.	
№ 19	3	I	»	»	
№ 19	3	I	»	»	
№ 18, 19, 35, 13, 34, 21, 17, С.	> 50	I	»	I	
№ 18	3	I	Цвет.	Натур.	*)
№ 18, 35	2	II	Не цвет.	»	
№ 18, 35	4	IV—V	Цвет.	»	
№ 19, 7	5	I	»	»	
№ 18, 19, 35, 9, 33, 10, 22, 20	> 30	I	Плод.	I	
№ 18, С ¹	3	I—II	»	II	¹ Дача б. Красави-на по Комсомольской ул.
9 пунктов	> 50	I	»	I	
№ 18, 35	2	I	»	II	

* По ошибке под № 101 см. № 438а.

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
109. <i>Catalpa Kaempferi</i> Sieb.	Катальпа Кемп-фера	Bignoniaceae	Япония
110. » <i>speciosa</i> War-der.	Катальпа велико-лепная	»	р. Миссисси-пи
111. <i>Ceanothus azureus</i> Desf.	Лазуревый цеа-нотус	Rhamnaceae	Мексика
112. <i>Callistemon lanceolat-um</i> DC.	Каллистемон лан-цетовидный	Myrtaceae	Австралия
113. <i>Celtis australis</i> L.	Железное дерево, каркас	Ulmaceae	Юж. Фран-ция, Юж. Азия, Сев. Амер., Кав-каз
114. <i>Celtis orientalis</i> L.	Каркас восточ-ный	»	Закавказье
115. <i>Cephalanthus occiden-talis</i> L.	Американск. го-лова.	Rubiaceae	Сев. Амер.
116. <i>Cerasus avium</i> Moen-nch.	Черешня	Rosaceae	Европа
117. <i>Ceratonia siliqua</i> L.	Рожковое дерево, цареградский стручок	Papilionaceae	Аравия, Бл. Восток
118. <i>Cercis canadensis</i> L.	Канадское нудино дерево	Papilionaceae	Канада
119. » <i>siliquastrum</i> L.	Евр. нудино де-рево	»	Юж. Европ. Азия
120. <i>Chaenomeles japonica</i> Lindl. (Syn. <i>Cydonia japonica</i>)	Японская айва	Rosaceae	Япония
121. <i>Chamaerops humilis</i> L.	Низкий хамеропс	Palmae	Италия, Испания
122. » » v. <i>duplicifolia</i> hort.	Низк. хамеропс . двулистный	»	Сад. форма
123. <i>Chamaerops humilis</i> v. <i>gracilis</i> Lodd.	Низк. хамеропс изящный	»	»
124. <i>Chamaerops humilis</i> v. <i>macrocarpa</i> hort.	Низк. хамеропс крупноплодн.	»	Африка

Местонахождение в районе		Морозоустойчивость	Плодоношение	Значение для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 10, 5, 17	> 10	I	Плод.	I	
№ 18 и др. 12 пункт.	> 25	I	»	I	
№ 18, 35	6	I, 3—II	»	I	
№ 18	3	II—(IV)	Цвет.	Натур.	
№ 19, 13	5	I	Плод.	II	
№ 19	3	I	»	Натур.	
№ 13 ²	1	I	»	»	¹ Около «Сальве»
Как подв. для культ. сад.	—	I	»	I	
№ 18, С ²	2	II—III	Цвет.	Нет	² Санат. «Кр. Москва», д. б. Гордон
№ 18, С ³ , X ⁴	7	I	»	»	³ Комсомольская, № 11 ⁴ Д. б. Кривцова
№ 18, 30, 9, 25, 34, 10, 5, 20, 32, 31, 29, С ⁵ , 19	> 30	I	Плод.	—	⁵ Комсомольская, 19, Нагорная, 5
№ 18, 13, 30, 19, 34, 35, 33, 22, 23, 16, 17, С, X	> 100	I	Цвет.	I	
№ 18, 12, 21, 23, 10, 16, 29, 17, С, X	> 100	II	Плод.	I	
№ 18	1	II	»	Натур.	
№ 18, 12	5	II	»	»	
№ 18	2	II	»	»	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
125. <i>Chamaerops humilis glaucophylla</i> hort.	Нивк. хамеропс голуболистн.	Palmae	Сад. форма
126. <i>Chionanthus virginica</i> L.	Снежное дерево	Oleaceae	Сев. Амер.
127. <i>Choisya ternata</i> Kunth.	Тройчатолистная хойзия	Rutaceae	Мексика
128. <i>Cinnamomum camphora</i> Nees. (Syn. <i>Laurus Camphora</i> , L.)	Камфорный лавр	Laugaceae	Япония
129. <i>Cinnamomum glandulifera</i> Meisn.	Лавр железистый	»	Формоза
130. <i>Cinnamomum pedunculatum</i> Breyn.	» черешчатый	»	Япония
131. <i>Cinnamomum sericeum</i> Sieb.	Шелковистый коричник	»	»
132. <i>Citrus aurantium</i> L.	Апельсин (поме-ранец)	Rutaceae	Азия
133. » <i>Bigaradia</i> Rissa	Горький померанец	»	»
134. » <i>decumana</i>	Пампельмус	»	Полннезия
135. » <i>japonica</i> Thnbg.	Кинкан	»	Япония
136. » » <i>foliis variegatis</i>	» пестро-листный	»	Сад. форма
137. <i>Citrus limonum</i> Risso	Лимон	»	Азия
138. » <i>medica</i>	»	»	»
139. » <i>nobilis</i> Mican Laur.	Мандарин японский	»	Китай
140. <i>Citrus sinensis myrtifolium</i>	Апельсин мирто-листный	»	»
141. <i>Citrus trifoliata</i> L.	Трехлистниковый лимон	»	Сев. Япония
142. <i>Citharexylum reticulatum</i> HB et Knth.	Лировое дерево	Verbenaceae	Кордильер
143. <i>Cytisus hirsutus</i> L.	Ракитник пуши-стый	Leguminosae	Сев. и Юж Евр. ч. Союза

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 12	3	II	Плод.	Натур.	
№ 35	6	I	Цвет.	»	
№ 18, 35, 12, 6, 25, 23, 20, X ¹ , 26, 17 ²	>100	I	»	I	¹ Д. б. Кривцова Д. б. Новицкого ² Санаторий им. Сталина
№ 18, 30, 29, 22, 9, 17, 32, 26	> 15	II—III	Плод.	Натур.	
22 натур. пункта	> 60	I—II	»	I	
№ 18, 35	5	I (II)	Не цвет.	Натур.	
№ 18	2	II—III	Цвет.	Нет	
№ 18, 19, 26	?	III—IV ^	»	Натур.	
№ 18, 19, 35, 34, 17	> 50	II	Плод.	I ³	³ Как подвой
№ 19, 16 ⁴	3	II—III	»	Натур.	⁴ Д. б. Подгур- ского
№ 18, 30, 34, 26 С	24	I—II	»	I	
№ 18	2	?	Не цвет.	Натур.	
№ 26	10	III—IV ^	Цвет.	Нет	
№ 18	2	?	Не цвет.	Натур.	
№ 18, 30, 34, 23, 32, 17, ⁵ С, 19, X	∞	II (III)	Плод.	I	⁵ Д. б. Якобсон
№ 18	2	?	Не цвет.	Натур.	
№ 18, 35, 9, 30, 34, 17 ⁶	∞	I	Плод.	I ⁷	⁶ Д. ЦКПроса ⁷ Подвой и изго- родь
№ 17 ⁸ , 32, 33	5	I	Цвет.	Натур.	⁸ Санат. им. Ста- лина
№ 18	За- росли	I	Плод	Нет	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
144. <i>Cytisus Laburnum</i> L.	Золотой дождь	Leguminosae	Ю.-з. Европа
145. » <i>Laburnum</i> L. v. <i>Adami</i> (Syn. <i>Laburnocytisus</i> Scheid.)	Золотой дождь Адама	»	—
146. <i>Cytisus purpureus</i> Scop.	Ракитник пурпуровый	»	Альпы
147. » <i>atisbonensis</i> Schaeff.	Ракитник двуцветковый	»	Евр. р., Сибирь, Крым Кавказ
148. <i>Cytisus pallidus</i> f. <i>Rochellii</i> Wierzb.	Ракитник Рошеля	»	Ю.-в. Европа
149. <i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Ракитник бесчешковый	»	Тироль, Истрия, Юж Франция
150. » <i>scoparius</i> f. <i>Andreanus</i> Dipp.	Дрок Андреана	»	Кавказ
151. <i>Cleyera japonica</i> Thunb.	Клейера японская	Ternstroemiaceae	Япония
152. <i>Clematis Jackmani</i> Jack. Th. Moore. (Hybr. <i>C. lanuginosa</i> x <i>Viticella</i>)	Ломонос Якмана	Ranunculaceae	Гибрид
153. <i>Clematis vitalba</i> L.	Обыкновенный ломонос	»	Кавказ
154. » <i>viticella</i> Lim.	Ломонос усатый	»	Средиземье
155. <i>Clerodendron foetidum</i> Bugl (Syn. <i>Cl. Bungei</i> , Stend.)	Клеродендрон пахучий	Verbenaceae	Сев. Китай
156. <i>Clerodendron trichotomum</i> Thumb.	Клеродендрон трихотомум	»	?
157. <i>Cocculus laurifolius</i> D. C.	Коккулус лавролистный	Menispermaceae	Индия
158. <i>Cocos australis</i> Mart.	Кокос	Palmae	Юж. Бразилия, Парагвай
159. » <i>capitata</i> Mart. (<i>Butia capitata</i>)	»	»	?

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 13, 35, 2, 1, 6, С, Х	> 50	I	Плод.	Нет (II)	
№ 35	19	I	»	II	
№ 18	1	?	Цвет.	Натур.	
№ 18	3	I	»	»	
№ 18	5	I	»	»	
№ 18	2	I	»	»	
№ 17 ¹	За- росль	I	Плод.	II	¹ Дача Горинова
№ 18, 35, 23	7	I	Цвет.	I	
№ 18	1	I - II	»	Натур.	
Дико (в парках случайно)	∞	I	Плод.	Нет	
№ 18, 19	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 30, 34, 31, 17 ² , Х ³ , С, А	∞	I - II	Плод.	II	² Санат. Розы Люк- сембург ³ Д. б. Новицкого
Цурюпинская сто- рона, д. б. Леви	1	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 12, 22, 16	8	II III	Не цвет.	Нет	
№ 18, 12, 17 ⁴ , С	6	II	Цвет.	»	⁴ Д. отд. ЦКПроса
№ 18, 17 ⁵	7	II	Плод.	II	⁵ Д. б. Якобсона Д. б. Федоров- ского, Свеглана

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
160. <i>Cocos Jatay</i> Mart.	Кокос	Palmae	Юж. Бразилия
161. <i>Colletia cruciata</i> Gill.	Коллетия крестовиднолист.	Rhamnaceae	Рио-де-ла-Плата
162. » <i>spinosa</i> Lamk.	Коллетия колючая	»	Чили, Перу
163. <i>Coprosma acerosa</i> A. Endb.	Копросма кленовидная	Rubiaceae	Нов. Зеландия
164. <i>Coprosma Baueriana</i> Linde	Копросма Бауэра	»	»
165. <i>Cordyline australis</i> , Kutn.	Кордилина австралийская	Liliaceae	»
166. <i>Corylus Avellana</i> , L.	Лещина, лесной орех	Betulaceae	Европа
167. » » <i>atro-purpurea</i>	Лещина пурпуровая	»	Сад. форма
168. <i>Corylus colurna</i> , L.	Древесная лещина, медвеж. орех	»	Закавказье
169. <i>Cornus mascula</i> Dulhoi	Кизил съедобный	Cornaceae	Европа
170. » <i>sanguinea</i> , L.	Красный дерен, свидина	»	Ср. Европа СССР, Юж Сибирь, Крым, Кавказ, Туркестан
171. <i>Cotoneaster buxifolia</i> , Wall.	Кизильник самшитовидн.	Rosaceae	Гималайск обл.
172. <i>Cotoneaster nepalensis</i> hort (Syn. <i>C. rotundifolia</i> , Wall.)	Кизильник непальский	»	»
173. <i>Crataegus oxyacantha</i> , L.	Боярышник обыкновен.	»	Ср. и юж. Евр., СССР Крым, Кавказ
174. » » <i>fl. pl. rosea et alba</i>	Боярышник обыкновен.	»	»
175. <i>Daphne indica</i> Schan- gin.	Дафния индийская	Thymelaeaceae	Алтай

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 30, 16, 32, 17 ¹	8	II	Плод.	—	¹ Д. б. Бразоль
№ 18, 32, С ²	3	I - II	»	Нет	² Комсомольск., 19
№ 18	1	I	»	II	
№ 18	2	III - IV	Не цвет.	Натур.	
№ 18	1	V	»	Нет	
18 натур. пунктов	> 50	II - (IV)	Плод.	II	
№ 18, 19, 35	3	I	»	I	³ Промышлен. сор- та
№ 13, 30, 35, 34	11	I	»	I	
№ 18	1	I	»	Нет	
№ 17 ⁴ , 18, 30	4	I	»	II	⁴ Д. б. Машицкого
№ 18	2	I	»	Нет	
№ 18	1	I	»	Натур.	
№ 18	1	I	Цвет.	»	
№ 18, 30, 21	11	I	Плод.	II	
№ 18	2	I	Цвет.	II	
№ 35, С ⁵	3	I, 3, III	»	Натур.	⁵ Комсомольская, 2

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
176. <i>Daphne indica</i> foliis variegatis hort.	Дафния пестролистная	Thymelaeaceae	Сад. форма
177. <i>Daphniphyllum macro-podum</i> , Mig.	Дафнефиллум макроподум	Euphorbiaceae	Япония
178. <i>Dasylirium glaucophyllum</i> , Hook.	Дазилириум сизолистный	Liliaceae	Мексика
179. <i>Dasylirium gracilis</i> , Zucc.	Дазилириум пучконосный	»	»
180. <i>Dasylirium longifolium</i> , Zucc.	Дазилириум длин-нолистн.	»	»
181. <i>Datura suaveolens</i> , Humb.	Датура, дурман	Solanaceae	»
182. <i>Desmodium canadensis</i> , D. C.	Десмодиум канадский	Papilionaceae	Канада
183. <i>Deutzia crenata</i> , Steb.	Дейция городчатолитная	Saxifragaceae	Япония
184. » <i>gracilis</i> , Steb.	Дейция грациозн. изящн.	»	»
185. » <i>Lemoinei</i> , Lem. (hybr. <i>D. parvifolia</i> X <i>D. gracilis</i>)	Дейция Лемуана	»	Гибрид
186. <i>Deutzia Staminea</i> , R. Br.	» тычиновидная	»	Гималаи
187. <i>Diervilla rivularis</i> , Moench.	Дирвиллия	Caprifoliaceae	Канада
188. <i>Diervilla trifida</i> , Moench. (Syn. <i>D. Lonicera</i> , Mill, <i>D. canadensis</i> Willd)	» (вейгелия канадск.)	»	»
189. <i>Dimorphanthus mand-schuricus</i> , Maxim.	Белый орех, диморфант	Araliaceae	Китай
190. <i>Diospyros Kaki</i> , L.	Хурма японская	Ebenaceae	Япония
191. » <i>Lotus</i> , L.	Дикий финик, хурма	»	Крым, Кавказ
192. » <i>virginiana</i> , L.	Хурма виргинская	»	Сев. Амер.

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 35	1	I, 3, IV	Цвет.	Натур.	
№ 18, 35	5	I—II	Не цвет.	»	
№ 18, 19, 3, 21, 33, 17 ¹ , С	11	I—II	»	»	¹ Санат. им. Ста- лина
№ 18, 17 ²	4	I	»	»	² Д. о. ЦКПроса д. б. Бразоль
№ 18, 10	3	I	»	»	
№ 18	10	III—IV	Цвет.	II	Легко возобно- вляется от кор- ней и пня
№ 18, 35	> 10	III—IV	Плод.	II	То же
18 натур. пунктов	∞	I	»	I	
№ 18, 19, 17 ³	3	I	»	Натур.	³ Д. о. ЦКПроса
№ 18, 35, 13, С	> 25	I	»	II	
№ 18	2	I	»	Нет	
№ 35, 18	3	I	»	»	
№ 18	5	I	Цвет.	»	
№ 18	3	I	»	»	
№ 18, 19, 30, 9, 33, 15, 10	21	I	Плод.	I	
№ 33, 29, 35, 13, С ⁴ (а также дико)	> 25	I	»	I ⁵	⁴ Аэродром ⁵ Подвой
№ 35, 19, 31	> 10	I	»	Натур.	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
193. <i>Distylium racemosum</i> Sieb. et Zucc.	Дистилум раце- зум	Hamamelida- ceae	Япония, Ки- тай
194. <i>Dracaena</i> Sp.	Драцена неиз- вестная	Liliaceae	?
195. <i>Edgewortia papyrifera</i> Sieb. et Zucc.	Эдгевортия бу- мажная	Thymelaeae- ceae	Япония, Ки- тай
196. <i>Elaeagnus edulis</i> Hort. (<i>E. parvifolia</i>)	Лох съедобный	Elaeagnaceae	Япония
197. <i>Elaeagnus macrophylla</i> , Thunb.	» крупнолист- ный	»	Япония, Ко- рея
198. <i>Elaeagnus pungens</i> , Thunb.	Лох колючий	»	Япония
199. <i>Elaeagnus pungens ar- gentea</i>	» серебристый	»	Сад. форма
200. <i>Elaeagnus pungens au- rea-variegata</i>	» японский— желтая форма	»	»
201. <i>Erica herbacea</i> L.	Вереск	Ericaceae	Юж. Европа Альпы
202. <i>Eriobotria japonica</i> , Lindl.	Мушмула япон- ская	Rosaceae	Китай
203. <i>Eryngium bromeliaefo- lium</i> Delar.	Синеголовник бромелнолистный	Umbelliferae	Мексика
204. <i>Erythrina crista-Calli</i> L.	Эритрина криста- галли	Leguminosae	Бразилия
205. <i>Escallonia macrantha</i> , Hook. et Arn.	Эскалония ма- кранта	Saxifragaceae	Чили
206. <i>Escallonia rubra</i> , Pers.	Эскалония крас- ная	»	»
207. <i>Eucalyptus albicaulis</i> ?	Эвкалипт бело- ватый	Myrtaceae	Австралия
208. » <i>amygdalina</i> , Labill.	Эвкалипт ядро- вый	»	»
209. <i>Eucalyptus bortyoides</i> , Smith.	Кистевой эвка- липт	»	»
210. <i>Eucalyptus coriacea</i> , A. Cunn (Species om. <i>E. Gunnii</i> , Hook)	Эвкалипт кожи- стый	»	Австралия, Тасмания

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18	1	I	Цвет.	Натур.	Женский экзем- пляр
№ 30, 32	5	II—(IV)	Плод.	»	
№ 18	5	II—3—V	Цвет.	»	
№ 18, X, C ¹	5	I	Плод.	I	¹ Д. б. Цветковой
№ 18, 33, 13	6	I	»	II	
15 натур. пунктов	> 50	I	»	I	
№ 18, 16, X. 22	6	I	»	II	
№ 18, 35, 16, 17, 19, 21, 20, 15	> 50	I	»	I	
№ 18, 35	3	I	Цвет.	Нет	
22 натур. пункта	> 100	I	Плод.	I	
№ 18, 11	7	I	Цвет.	II	
№ 35	2	III—(V)	Цвет.	Натур.	² Верещагинский арк
№ 35, 18	4	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 35, 33, 13, 16 ²	> 25	I	»	»	
№ 18	2	III—IV	Не цвет.	Нет	
№ 18, 30	2	II—III	Цвет.	»	
№ 18	2	II—III	Плод.	II	
№ 18	1	III—IV	Не цвет.	Нет	

Наименование растений		Семейство
Латинское	Русское	
1	2	
211. <i>Eucalyptus globulus</i> , Labill.	Эвкалипт голубой	Myrtaceae
212. <i>Eucalyptus Gunnii</i> , Hook.	Эвкалипт гунна	»
213. » <i>parviflora</i> 5. Muell.	» парвифлора	»
214. » <i>rostrata</i> , Schlecht.	Клювовидный эвкалипт	»
215. <i>Eucalyptus tereticornis</i> Sm.	Эвкалипт круторогий	»
216. » <i>viminialis</i> , Lab.	Прутяной эвкалипт	»
217. <i>Eucommia ulmoides</i> , Oliver.	Вязолистная эвкомия	Hamamelidaceae
218. <i>Eugenia australis</i> , L.	Еугения аустралис	Myrtaceae
219. <i>Eupatorium Morisii</i> Wis.	Конопельник Мориза.	Compositae
220. <i>Evonymus japonica</i> , L.	Японский бересклет	Celastraceae
221. » » <i>Lim.</i> f. <i>alba marginatus</i>	Японский белоокаймлен.	»
222. <i>Evonymus japonica aurea-variegata</i>	Японский золотистый	»
223. <i>Evonymus fimbriata</i> Wall. (<i>E. pendula</i> Wall)	Бересклет бахромчатый	»
224. <i>Evonymus pulchellus</i> hort.	Бересклет красивый	»
225. <i>Evonymus radicans</i> , Sieb. u. Zucc.	Ползучий бересклет (укореняющийся)	»
226. <i>Exochorda grandiflora</i> , Lindl.	Эксохорда крупнолистная	Rosaceae
227. <i>Fabiana imbricata</i> , R.	Фабиана черепчатая	Solanaceae
228. <i>Fagus ferruginea</i> , Ait.	Бук американский	Fagaceae

Местонахождение в р. йоне		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 17 ¹ , С	3	III	Цвет.	Нет	¹ Д. б. Берже
№ 18	1	I—II	Не цвет.	Натур.	
№ 18	2	III	»	Нет	
№ 18	2	III—IV	»	»	
№ 18	1	III—IV	»	»	
№ 18, 35, 30, 33, 17, 16	> 25	II—III	Плод.	I	
№ 18 мужской экземп.	1	I	Цвет.	Натур.	
№ 18	1	II—IV	»	»	
№ 18, 16, 17 ²	6	I	Плод.	II	
20 натур. пунктов	∞	I	»	I	
№ 18, 16, 17, 13, 15, 35, 19, 21 С	> 100	I	Цвет.	I	² Д. б. Горнинова
№ 18, 35, 16	> 10	I	»	I	
№ 18, 35	5	I	»	Натур.	
13 натур. пунктов	В бор- дюрах	I	Не цвет.	II	
№ 18, 35, 16	5 ³	I	»	II	
№ 18	1	I	Плод.	Натур.	
№ 18, 16	8	I	Цвет.	»	
№ 19, 35, 13	3	I	»	Нет	³ У них 3 формы albo-marginatus

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
229. <i>Fagus orientalis</i> , Lipsn.	Бук восточный	Fagaceae	Кавказ
230. » <i>sylvatica</i> , L.	» обыкновенный	»	Крым, Кавказ, зап. Евр. Союз
231. <i>Fagus sylvatica</i> , v. <i>atropurpurea</i> , Ait.	Бук обыкновенный пурпуролост.	»	Юж. Тирол
232. <i>Fagus sylvatica</i> , <i>pendula</i> hort.	Бук обыкновенный плакучий	»	Сад. форм
233. <i>Feioja selloviana</i> , Berg.	Фейхоя	Myrtaceae	Бразилия
234. <i>Ficus carica</i> , L.	Смоковница, инжир	Moraceae	Закавказье
235. » <i>piriformis</i> Hook.	Фигус грушелистный	»	?
236. » <i>repens</i> , Willd (Syn. <i>F. stipulata</i> , Thumb.)	» ползучий	»	В. Индия
237. <i>Fontanesia Fortunei</i> , Carr. (Syn. <i>F. phillyreoides</i> , L.)	Фонтанезия форчуна	Oleaceae	Китай
238. <i>Forsythia suspensa</i> , Sieb. u. Zucc. Wahl.	Форзиция поникшая	»	»
239. <i>Forsythia viridissima</i> , Ldl.	Форзиция темно-зеленая	»	»
240. <i>Fraxinus acuminata</i> , Lam (Syn. <i>Fr. americana acuminata</i> , C. Koch.)	Ясень остроко- нечный	»	Сев. Амер.
241. <i>Fraxinus Bungeana</i> , Max.	Ясень Бунге	»	Сев. Китай
242. » <i>excelsior</i> , L.	» обыкновенный	»	Евр. СССР Крым, Кавказ
243. » » v. <i>crispa</i> , Willd.	Ясень курчавый	»	Сад. разн.
244. <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>simplicifolia</i> , Willd	» однолист- ный	»	»
245. <i>Fraxinus excelsior</i> <i>pendula</i>	Ясень плакучий	»	»

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол экз				
5	6	7	8	9	10
По всему району дико в парках № 1, 2, 7, 8, 19	— >10 ¹	I I	Плод. Цвет.	Нет »	¹ Точно установить трудно некото- рые экземпляры
№ 18, 29, 35	4	I	»	II	
№ 18	1	I	Не цвет.	Натур.	
№ 18, 29, 33, 16, 26, 35, 19, 17 ¹ , С ²	38	I—(II)	Цвет.	Натур.	¹ Дача Горинова ² Пограничная, 28 Ольгин тупик, 2 Красная Москва
№ 18, 9, 33, 17, 16, 32, X, С	> 50	I	Плод.	II	
№ 18	1	II III	Цвет.	Натур.	
№ 18, С ³ , 12, 11	> 10	II	»	II	³ Постройка на 3-й версте
С ⁴	2	I	Плод.	Натур.	⁴ Комсомольская, 2
№ 17, 16	3	I	Цвет.	II	
№ 18, 5, 33, 21, 17 ⁵ , 27, 13	> 20	I	»	I	⁵ Дача Горинова
№ 10	1	I	Не цвет.	Натур.	
№ 13	2	I	Цвет.	Нет	
№ 35, 13, 12, 9, 33, 10, С, X и дику	∞	I	Плод.	»	
№ 18	1	I	Цвет.	»	
№ 13	1	I	»	»	
Сочи, санат. «Кр. Москва»	1	I	»	»	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
246. <i>Fraxinus Oregona</i> , Nutt.	Ясень оregonский	Oleaceae	Зап. и Сел Амер.
247. » <i>Ornus</i> , L.	» цветочный	»	Юго-зап. Европа
248. <i>Frejlinia cestroides</i> Colla.	Фрейлиния узко- листная	Scrophularia- ceae	Капландия
249. <i>Gardenia florida</i> L.	Гардения фло- рида	Rubiaceae	Китай
250. » <i>radicans</i> Thbg.	Гардения укореняющаяся	»	Япония
251. <i>Garrya Thuretti</i> Carr.	Гаррия турети	Cornaceae	Зап. и Сел Амер.
252. <i>Genista Hispanica</i> L.	Дрок испанский	Leguminosae	Испания, Юж. Фран- ция, Сев. Италия
253. <i>Gleditschia triacanthos</i> L.	Гледичия обыкно- венная	»	Вост. и Се Америка
254. <i>Glycine shimensis</i> Sims.	Глициния китай- ская	»	Китай, Яп ния
255. » <i>frutescens</i> L.	Глициния полу- кустарниковая	»	Сев. Амер
256. <i>Gymnocladus canadensis</i> Lam.	Бундук канадский	»	»
257. <i>Grevillea robusta</i> Cung.	Гревилея робуста	Proteaceae	Австралия
258. » <i>rosmarinifolia</i> A. Cunn.	» разма- ринолист.	»	»
259. <i>Habrothamnus elegans</i> Schneid.	Габротамнус эле- ганс	Solanaceae	Мексика
260. <i>Halimodendron argenteum</i> Fisch.	Чемыш серебри- стый	Leguminosae	Закавказье Сибирь
261. <i>Hamamelis virginica</i> L.	Волшебный орех	Hamamelida- ceae	Сев. Амер
262. <i>Hedera colhica</i> C. Kar.	Плющ колхид- ский	Araliaceae	Закавказье
263. » <i>Helix</i> L.	Плющ обыкно- венный	»	Зап.-евр. СССР, Кры

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз				
5	6	7	8	9	10
№ 13, 10	2	I	Цвет.	Нет	
№ 13, 26, 17 ¹ , 10, С., Х.	> 15	I	Плод.	II	¹ Дом отдыха ЦКа рабпроса
№ 18, 16	8	II	Цвет.	II	
№ 35	2	I	»	Натур.	
№ 18, 35, 30, 19	> 15	I—3—III	»	II	.
№ 18 ²	1	I	»	Нет	² Женск. экземпль.
№ 30	> 10	I	Плод.	Натур.	
18 натур. пунктов	—	I	»	I	
19 натур. пунктов	> 50	I	»	I	
№ 18, X ²	2	I	»	I	³ Д. б. Кривцова
№ 19, 13	6	I	»	II	
№ 18	2	III—V	По цвет.	Нет	
№ 18	2	IV	»	»	
№ 18	5	?	»	Натур.	
С ⁴	3	I	Цвет.	Нет	⁴ Первомайская, 19
№ 18	15	I	»	II	
№ 18, 35, 29 (и дико)	> 10	I	Плод.	II ⁵	⁵ Применять осто- рожно (паразит)
По всему району и паркам	∞	I	»	Нет	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
264. <i>Hedera Helix arborescens</i>	Плющ древовидный	Agallaceae	Закавказье.
265. <i>Hibiscus syriacus</i> , L.	Сирийская роза, кэзмия	Malvaceae	Сирия
266. » » <i>variegatis hort.</i>	Сирийская роза пестролистн.	»	Сад. форма
267. <i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Облепиха	Elaeagnaceae	Кавказ, побережье моря
268. <i>Hovenia dulcis</i> , Thbg.	Конфетное дерево	Rhamnaceae	Япония, Китай
269. <i>Hydrangea hortensis</i> , Smit.	Гортензия обыкновен.	Saxifragaceae	»
270. <i>Hydrangea hortensis</i> , albo-marginata	Гортензия белоокаймлен.	»	Сад. форма
271. <i>Hydrangea paniculata</i> , Sieb. u. Zucc.	Гортензия метельчатая	»	Япония
272. <i>Hydrangea quercifolia</i> , B. rti.	Гортензия дуболистная	»	Ю.-в. и Сев Амер.
273. <i>Ilex Aquifolium</i> , L.	Падуб остролистный	Aquifoliaceae	Закавказье
274. » » <i>foliis variegatis</i>	Падуб пестролистн.	»	Сад. форма
275. <i>Ilex Aquifolium</i> f. <i>ferox hort.</i>	Падуб колючий	»	Сад. форма
276. <i>Ilex Aquifolium</i> f. <i>Hendersonii</i>	» Гендерсона	»	»
277. <i>Ilex cornuta</i> , Lindl.	Падуб рогатый	»	Китай
278. » <i>crenata</i> , Thumb.	» городчатолистный	»	Япония
279. » <i>latifolia</i> , Thbg.	Падуб крупнолистный	»	»
280. <i>Illicium anisatum</i> , L.	Бадьян	Magnoliaceae	»
281. <i>Indigofera decora</i> , Lindl. (Syn. <i>I. reticulata</i> , Kochne)	Индиго декара	Leguminosae	Китай, Япония
282. <i>Indigofera Dosua</i> , Lindl	» досуа (Герарда)	»	Гималаи

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18	1	I	Цвет.	II	
25 натур. пунктов	∞	I	Плод.	II	
№ 18, 16, С	> 25	I	»	II	
В некоторых пар- ках и дико	∞	I	»	Нет	
№ 35, 18, 19, 30, 33, 23	9	1—(II)	Цвет.	Натур.	
18 натур. пунктов	> 100	I	»	I	
17 ¹ , 18, 35	> 10	I	»	I	¹ Санат. Р. Люк- сембург
№ 18, 19, 35	12	I	»	II	
№ 18	1	I	»	Нет	
№ 18, 29, 33, 17 ² , 35, 19	> 15	I	Плод.	»	² Санат. Сталина, д. б. Горинова
№ 18, 17, 19, 15, 35	11	I	»	II	
№ 18	1	I	Цвет.	Нет	
№ 18 С ³	2	I	»	Натур.	³ Комсомольск., 19
№ 18	2	I	Плод.	Нет	
№ 18	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 10, 21, 4, 17, 16, 20, С ⁴	> 15	I	Плод.	I	⁴ Московск. ул., д. Годзи
№ 18	2	I—II	Цвет.	Нет	
№ 18	2	»	»	Натур.	
№ 18	3	1 (II)	Плод.	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
283. <i>Jasminum floridum</i> , R. Br.	Жасмин многоцветный	Oleaceae	Китай
284. <i>Jasminum humile</i> , L.	Жасмин приземистый	»	Непал.
285. » <i>grandiflorum</i> L.	Жасмин крупноцветный	»	Гималаи
286. <i>Jasminum nudiflorum</i> , Lindl.	Жасмин голоцветный	»	Китай
287. <i>Jasminum polyanthum</i> , Frauch.	Жасмин вьющийся	»	»
288. <i>Jasminum primulinum</i> , Hemsl.	Жасмин первоцветный	»	Китай
289. <i>Jasminum officinale</i> , L.	Жасмин настоящий	»	Закавказье
290. » <i>odoratissimum</i> , L.	Жасмин душистый	»	Мадера
291. <i>Jasminum revolutum</i> , Sims.	Жасмин завитой	»	Гималаи, Индия, (Сальве)
292. <i>Jasminum Wallischnum</i> , Lindl.	» Валлиха	»	»
293. <i>Jubaea spectabilis</i> , H. B. A.	Пальма медовая	Palmae	Чили
294. <i>Juglans nigra</i> , L.	Орех черный	Juglandaceae	Сев. Амер.
295. » <i>regia</i> , L.	» грецкий	»	Закавказье, Греция, Азия
296. <i>Kerria Japonica</i> , D. C.	Керрия японская	Rosaceae	Япония, Китай
297. » » <i>f. alba marginata</i>	» пестролистная	»	Сад. форм.
298. <i>Koelreuteria paniculata</i> , Lam.	Мыльное дерево	Sapindaceae	»
299. <i>Lagerstroemia indica</i> , L.	Лагерстемия индийская	Lythraceae	Индия
300. <i>Laurus nobilis</i> , L.	Лавр благородный	Lauraceae	Средиземноморск. о.

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 17, 16, G	> 15	II	Цвет.	II	
№ 18, 16, C, 12, 35	11	I	»	II	
№ 13	1	I	»	Натур.	
№ 17, дача Якоб- сон	> 50	I	Плод.	II	
№ 17, дача ЦКПро- са	1	I—II	Цвет.	Натур.	
№ 14, 26	2	I	»	»	
№ 17, 33, 29, 11, 13	6	I	»	I	
№ 18	1	?	»	Натур.	
№ 13	1	I	»	»	
№ 13	1	I	»	»	
№ 18	3	I—II	Не цвет.	II	
С ¹ , 19	3	I	Плод.	Нет	¹ Совхоз имени Ле- нина
12 пунктов (и дико)	∞	I	»	I	
№ 16, C ²	2	I	Цвет.	II	² Комсомольская, дача Красавина
№ 29	1	I	»	Натур.	
№ 35, 17 ³	3	I	Плод.	II	³ «Светлана» и «Элит»
24 натур. пункта	> 100	I	Цвет.	I	
24 натур. пункта (и одичало)	∞	I	Плод.	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
301. <i>Laurus nobilis</i> , v. <i>angustifolia</i> hort.	Лавр благородный	Lauraceae	Средиземно-морс. об.
302. <i>Laurus regalis</i> , Nees.	Калифорнский сассафрас	»	Калифорния
303. <i>Lavandula spica</i> , D. C.	Лаванда, благовонный колос	Labiatae	Ю.-з. Европа
304. <i>Leycesteria formosa</i> , Wall.	Лейцестерия прекрасная	Caprifoliaceae	Гималаи
305. <i>Leptospermum Henryi</i> , Hemsl.	Лептоспермум Генри	Myrtaceae	Австралия
306. <i>Leptospermum lonigerum</i>	Лептоспермум лонигерум	»	»
307. <i>Lespedeza bicolor</i> , Turcz.	Леспедеца двухцветная	Leguminosae	Амурск. и Уссур. обл.
308. <i>Ligustrum Jbota</i> , Steb. et Zucc.	Бирючина Ибота	Oleaceae	Япония, Китай
309. <i>Ligustrum japonicum</i> , Thbg.	» японская	»	Япония
310. <i>Ligustrum lucidum</i> , Ait.	Бирючина блестящая	»	Юж. Китай
311. » <i>lucidum foliis variegatis</i>	Бирючина пестролистная	»	Сад. форма
312. <i>Ligustrum lucidum</i> v. <i>coriaceum</i> , Decaisne	Бирючина приземистая	»	»
313. <i>Ligustrum ovalifolium</i> , Hassk.	Бирючина овалолистная	»	Япония
314. <i>Ligustrum sinense</i> v. <i>multiflorum</i> hort.	Бирючина китайская	»	Китай
315. <i>Ligustrum vulgare</i> , Linn.	Бирючина обыкновенная	»	Крым, Кавказ, юг евр. ч. СССР
316. <i>Liquidambar styraciflua</i> , L.	Ликвидамбр styraciflua	Hamamelidaceae	Мал. Азия
317. <i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	Ликвидамбр восточный	»	С. Америка
318. <i>Liriodendron tulipifera</i> , L.	Тюльпановое дерево	Magnoliaceae	»

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, С ¹	2	I	Плод.	II	¹ Комсомольск., 19
№ 18, 25, 17 ²	3	I	Цвет.	Натур.	² Д. от. ЦКПроса
№ 32, 31, 29	∞	I	»	II	
№ 18, 20	> 15	I - (III)	Плод.	II	
№ 18	1	?	Цвет.	Натур.	
№ 18	1	II—3—IV	»	»	
№ 18, 35	> 10	I	Плод.	Нет	
№ 18	1	?	Цвет.	Натур.	
№ 20, 18, 19, 35, 17 ³	> 25	I	Плод.	II	³ Д. от. ЦКПроса «Светлана» и «Элит»
№ 18, 12, 9, 20, 33, 34, 2, 1, 24, 3, 17, 16	> 50	I	»	I	
№ 18, 35, 19, С, X	> 25	I	»	III	
№ 18, 35, 12, 15, 16, 17, 20, С, X	> 50	I	»	I	
№ 18, 17 ⁴ , 35	7	I	»	Натур.	⁴ Д. отд. ЦКПроса
№ 18, 35	3	I	Цвет.	»	
№ 16, 18, 19, 13 (и дико)	∞	I	Плод.	Нет	
№ 18, 33, 34, 3, 6, 20 ⁵ , 19, X, С	> 60	I	»	I	⁵ Дача Горинова
№ 30	1	I	Цвет.	Натур.	
24 натур. пункта	> 100	I	Плод.	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
319. <i>Lonicera brachypoda</i> , DC.	Жимолость гибкая	Caprifoliaceae	Китай, Япония
320. <i>Lonicera caprifolium</i> , L.	Каприфоль обыкновенен.	»	Кавказ
321. » <i>Morrowii</i> , A. Gray.	Жимолость душистая	»	Китай
322. <i>Lonicera fragrantissima</i> , Carr.	Жимолость Моррова	»	Япония
323. <i>Lonicera japonica</i> Thune.	Жимолость японская	»	»
324. » <i>nitida</i> , Wils.	Жимолость блестящая	»	Китай
325. » <i>pileata</i> , Oliv.	Жимолость шляпочная	»	»
326. <i>Maclura aurantiaca</i> , Nutt.	Маклюра оранжевая	Moraceae	С. Америк
327. <i>Magnolia Alexandrina</i> , hort.	Магнолия Александрина	Magnoliaceae	Япония, Китай
328. <i>Magnolia conspicua</i> , Salisb.	»	»	»
329. <i>Magnolia fuscata</i> , Andr.	Магнолия коричневая	»	Китай
330. » <i>glauca</i> , L.	Магнолия сизая	»	Америка
331. » <i>grandiflora</i> , L.	» крупноцветная	»	С. Америк
332. » <i>Julan</i> , Desf.	Магнолия лилейная	»	Япония, Китай
333. » <i>Kobus</i> , DC.	Магнолия кобус	»	Япония
334. » <i>macrophylla</i> , Michaux.	» крупнолистная	»	С. Каролины, Флорида
335. <i>Magnolia purpurea</i> , Curt.	Магнолия пурпуровая	»	Япония, Китай

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 13, 22, 15, 16 ¹ , 29	> 15	I	Цвет.	II	¹ Д. б. Цветковой
№ 18, 13, 19, а также дико	∞	I	Плод.	Нет	
№ 18, 33, 16, А ² , 17 ³ , 16, 26	11	I	Цвет.	II	² Д. б. Цветковой ³ Дом Кукаш
№ 18	4	I	Плод.	Нет	
№ 20	4	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 35	4	I	»	II	
№ 18	1	?	Не цвет.	Натур.	
18 пунктов	∞	I	Плод.	I	
16, 26, 17 ⁴ , 18, С ⁵	8	I	»	II	⁴ Московск, 2 Комсомольск., 19 Красная Москва ⁵ 3-я верста, сан. Военстрой ⁶ Д. Горинова ⁷ Дача Кукаш
№ 18, 35, 33, С ⁶	6	I	Цвет.	II	⁸ Дача Кукаш
№ 18, 30, 35, 17 ⁷ , А ⁸ , С ⁹	16	I	Плод.	II	⁹ Комсомольск, 18
Комсомольская ул. д. Иерусалимского	1	I	»	I	
По всему району	∞	I	»	I	
№ 18	1	I	»	Натур.	
№ 18, 35	4	I	Цвет.	»	
№ 18, 35	3	I—3 - III	Плод.	II	
№ 18, 35, 19, 30, 16, 20, С	> 25	I	»	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
336. <i>Magnolia Soulangeana</i> hort.	Магнолия суланже	Magnoliaceae	Япония, тай
337. <i>Magnolia stellata</i> , Maxim.	Магнолия звездчатая	»	Япония
338. <i>Mahonia Aquifolium</i> , Lindl.	Магония падуболистная	Berberidaceae	С. Амер.
339. <i>Mahonia Fortunei</i> , Lindl.	Магония фортуна	»	Китай
340. » <i>japonica</i> de Cand.	Магония японская	»	Китай, Япония
341. <i>Mahonia japonica</i> Bealei, Fedde.	Магония Беалея	»	Китай
342. <i>Mallotus japonica</i> , Muell.	Маллотус японский	Euphorbiaceae	Япония
343. <i>Melia Azedarach</i> , L.	Персидская мелия, сикомора	Meliaceae	Формоза, Китай
344. » <i>dubia</i> Cav.	Мелия дубия	»	?
345. <i>Metrosideros rigida</i> hort.	Метросидерос	Myrtaceae	Австралия
346. <i>Morus alba</i> , L.	Шелковица белая	Moraceae	Астрахань, Кавказ
347. » » <i>f. pendula</i>	Шелковица плакучая	»	Садоводство
348. » <i>nigra</i> , L.	Шелковица черная	»	Закавказье
349. <i>Musa Basjoo</i> , S. A. Z.	Японский банан	Musaceae	Япония
350. » <i>Ensete</i> , Gm.	» »	»	Абиссиния
351. <i>Myrsine africana</i> , L.	Мирзине африканская	»	Мыс Надежды
352. <i>Myrtus bullata</i> , Buxs.	Мирта пузырчатая	Myrtaceae	»
353. » <i>communis</i> , L.	Мирта обыкновенная	»	Средиземное море
354. » » <i>annulata</i>	Мирта обыкновенная	»	»

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35	3	I	Плод.	II	¹ Комсомольская, д. 6. Красавина и Качко
№ 18, С ¹	3	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 16, 35	5	I	»	Нет	
№ 18, 22, 12, 16, 17, 29, 32, 31	> 25	I	Плод.	I	
№ 18, 35	3	I	»	II	
№ 35, 18	4	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 19, 35, 20, 26	8	I	Цвет.	II	
18 пунктов	< 100	I	Плод.	I	
№ 18	2	III—V	Не цвет.	Нет	² Дом Горинова
№ 18	4	II—III	Цвет.	Натур.	
№ 13, 30, С, 19	> 10	I	Плод.	Нет	
№ 32, 20, 29, 17 ²	4	I	Цвет.	»	
№ 19, 13, 20, 26, С	> 50	I	Плод.	I	
№ 18, 19, 33, 22, 21, 33, 30, 17, 16	∞	III—IV	Цвет.	II	
№ 18, 29	3	IV—(V)	Не цвет.	Нет	
№ 18	1	I	Цвет.	»	
№ 18	2	?	Не цвет.	Натур.	
№ 18, 10, 20, 25, 30, 16, 32, А, С	> 25	I—(II)	Цвет.	II	
№ 18	2	I	Не цвет.	Натур.	

Наименование растений		Семейство	Родина
Л а т и н с к о е	Р у с с к о е		
1	2	3	4
355. <i>Myrtus communis</i> f. <i>italica</i>	Мирта итальянская	Myrtaceae	Средиз. море
356. <i>Nandina domestica</i> , Thng.	Найдина	Berberidaceae	Япония, Китай
357. <i>Nerium oleander</i> . L.	Олеандр	Aprocytaceae	Средиземн. море
358. <i>Olea europaea</i> , L.	Маслина	Oleaceae	»
359. <i>Osmanthus aquifolium</i> , Sieb. et Zucc (Syn. <i>Olea aquifolium</i> S. et Z, <i>O. ilicifolia</i> , Hass.)	» колючая	»	Япония
360. <i>Osmanthus aquifolium ilicifolius</i> hort.	» »	»	»
361. <i>Osmanthus aquifolium ilicifolius variegatus</i> hort.	» пестролистная	»	Сад. формы
362. <i>Osmanthus aquifolium myrtifolius</i> hort.	Маслина пестролистная	»	»
363. <i>Osmanthus aquifolium rotundifolius</i> hort.	Маслина пестролистная	»	»
364. <i>Osmanthus fragrans</i> , Laur. (Syn. <i>Olea fragrans</i> , Thunb.)	Маслина душистая	»	Китай, Япония, Чили
365. <i>Osmanthus fragrans</i> , flore rubro hort. (Syn. <i>Olea rubra</i> hort)	Маслина душистая красная	»	Сад. формы
366. <i>Osmunda regalis</i> , L.	Царственный папоротник	Filices	Кавказское побережье
367. <i>Osteomeles anthyllifolia</i> , Lindl.	Остеомелес сложнolistный	Rosaceae	Китай
368. <i>Paeonia Moutan</i> Sims. (Syn. <i>P. arborea</i> Don)	Пион древовидный	Ranunculaceae	Китай, Япония
369. <i>Paliurus aculeatus</i> , Zamk	Держи-дерево — чортов куст	Rhamnaceae	Крым, Кавказ
370. <i>Passiflora coerulea</i> , L.	Пассифлора церулея	Passifloraceae	Бразилия

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 19, 35, 13, 20, 17, 20, 33, 3, 32, 29, С, А	> 50	I	Плод.	I	1. Комсом., 18, са- наторий Красная Москва
№ 18, 35, 17, 16, 20, С 1	> 35	I	Цвет.	II	
0 натур. пунктов	∞	I—II	Плод.	I	
№ 18, 19, 33, 22, 15, 20, 34, 5, 30, 29, 17, 26, 11, 16	> 50	I	»	II	
24 натур. пункта	> 60	I	Цвет.	II	
№ 18, 35, 19, 25	8	I	»	Нет	
№ 18, 35, 19, 13, 17, 16	> 20	I	»	II	
№ 35	2	I	»	Натур.	
№ 18, 35, 25	> 10	I	»	II	
31 натур. пункт	> 100	I	»	I	
С *	4	I	»	II	2. Ольгинский ту- пик, д. 6. Задор- рина, Комсо- мольская, 19
№ 18, 35 (Адлер, дики)	16	I, 3, IV	Споры	Нет	
№ 18	1	I	Цвет.	Натур.	
№ 18	2	I—II	»	»	
№ 18 (дики)	∞	I	Плод.	Нет	
№ 18, 12, 15, 25, 3, 30, 32, С, 17	> 20	I	»	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
371. <i>Passiflora violacea</i> , Well.	Пассифлора голубая	Passifloraceae	Бразилия
372. <i>Paulownia imperialis</i> , S. et Z.	Павловния царская	Scrophulariaceae	Китай, Япония
373. <i>Periploca graeca</i> , L.	Обвойник	Asclepiadaceae	Ср. Европ. Кавказ
374. <i>Phellodendron amurense</i> , Rupr.	Бархат, пробковое дерево	Rutaceae	Амурск. Уссурийск. обл.
375. <i>Philadelphus coronarius</i> , L.	Чубушник—дикий жасмин	Saxifragaceae	Кавказ, Европа
376. <i>Philadelphus Fortunei</i> ?	Чубушник фортуна	»	Гибрид
377. » <i>grandiflorus</i> , Willd.	Чубушник крупноцветный	»	С. Америки
378. <i>Philadelphus spectabilis</i> Hort. (<i>P. pubescens</i> f. <i>coronarius</i> = <i>P. nivalis</i> Jasques v. <i>plenus</i> Rehd) = <i>P. n. spectabilis</i> pl. Hort.	—	»	Гибрид
379. <i>Phillyrea angustifolia</i> , L.	Филлирея узколистная	Oleaceae	Ю. Евр., Африка
380. » <i>Vilmoriniana</i> , Bois.	Цхамаз	»	Закавказье
381. <i>Phyllostachys aurea</i> A. AC Riv.	Бамбук золотистый	Gramineae	Вост. Азия
382. <i>Phyllostachys Castillonis</i> , F. Mitt.	Бамбук кастиллонис	»	Япония
383. <i>Phyllostachys Henonis</i> , F. Mitt.	Бамбук хачику	»	»
384. <i>Phyllostachys mitis</i> . A. et C. Riv.	» митис	»	»
385. <i>Phyllostachys nigra</i> , Munra (Syn. <i>P. nigra</i> , Lindl.)	» черный	»	»
386. <i>Phyllostachys pubescens</i> A. AC. Riv. (Mooso)	«Моосо»	»	»

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 12	2	II, 3—III	Цвет.	Натур.	
20 натур. пунктов	>100	I	Плод.	I	
№ 18, 19, 12, 35 (и дико)	∞	I	»	Нет	
№ 18	1	I—3—II	Не цвет.	»	
№ 18, 15, 25, 32, 31, 29, 34, 17, 16	> 50	I	Плод.	II	
№ 18, 35	3	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 35, 26, 11	> 15	I	Плод.	I	
№ 85, 18	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 18	1	I	»	II	
№ 18, 17 ¹ , C ²	3	I—3—III	»	Натур.	¹ Санат. им. Ста- лина
№ 18, 12, 33, 17, 16, C, 35	∞	I	»	I	² Комсомольск., 19
№ 18	3	?	—	Натур.	
№ 18, 35, 5	∞	I	—	I	
№ 18, 35, 12, 5	∞	I	—	I	
№ 18, 33, 5, 17, C	∞	I	—	I	
№ 18, 35, 5	∞	I	—	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
387. <i>Phyllostachys Quilloi</i> A. et C. Riv.	«Молаке»	Gramineae	Япония
388. <i>Phlomis fruticosa</i> , Lap.	Фломис фрути- коза	Labiatae	Балканск. полуостр., Италия
389. <i>Phoenix canariensis</i> hort.	Канарский финик	Palmae	Канарские острова
390. <i>Phoenix senegalensis</i> hort	» »	»	—
391. <i>Phoenix silvestris</i> . Roxb.	Индийская фи- ник. пальма	»	Индия
392. » <i>tenuis</i> hort.	Финик тонкий	»	»
393. <i>Photinia serrulata</i> , Lindl.	Фотиния пило- видная	Rosaceae	Китай и Япония
394. <i>Pistacia Lentiscus</i> , L.	Фисташник ма- стичный	Anacardia- ceae	Средиз. море
395. » <i>sp.</i>	Фисташник неиз- вестный	»	—
396. <i>Pittosporum cornifolium</i> , A. Cum.	Питтоспорум ки- зилолист.	Pittospora- ceae	Нов. Зелан- дия
397. <i>Pittisporum crassifolium</i> Sol.	Питтоспорум тол- столистн.	»	»
398. <i>Pittisporum Enderi</i> , Rgl.	Питтоспорум Эн- дери	»	Австралия
399. » <i>Tobira</i> , A. T.	Питтоспорум па- хучий	»	Япония
400. » » <i>t.-va-</i> <i>riegatis</i>	Питтоспорум пе- стролистный	»	Сад. форма
401. <i>Pittisporum viridiflo-</i> <i>rum</i> , Sims.	Питтоспорум зе- леноцветный	»	?
402. <i>Plagiospermum sinense</i> , Oliver.	Вишня колючая	Rosaceae	Манчжурия Китай
403. <i>Platanus californica</i> , Benth.	Платан кали- форнский	Platanaceae	Калифорния
404. <i>Platanus occidenta-</i> <i>lis</i> , L.	Чинар западный	»	С. Америка

Местонахождение в районе		Мор- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35, 12, 5	∞	I	—	II	
№ 18, 20	8	I	Плод.	Натур.	
№ 18, 12, 33, 30, 17, 16, 26	> 20	II - V	»	I	
№ 18	3	II	Цвет.	Натур.	
№ 18	1	III	»	Нет	
№ 18	1	III	Не цвет.	»	
18 натур. пунктов	> 50	I	Плод.	I	
№ 18, жен. экземпляр	2	I	Цвет.	II	
№ 18, мужской экземпляр	1	I	»	Натур.	
№ 18, С ¹ , 17 ²	> 25	I—(II)	»	II	¹ Приморск, д. б. Петрова «Крас- ная Москва»
№ 18	2	I	»	Натур.	² Д. б. Горинова
№ 18	3	I	»	II	
17 натур. пунктов	> 50	I	Плод.	I	
16, С ³ , 35	6	I	Цвет.	II	³ Комсомольск., 19
№ 18	18	I	Плод.	I	
№ 18	—	?	Не цвет.	Нет	
№ 35, 13	2	I	Цвет.	Натур.	
26 натур. пунктов	∞	I	Плод.	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
405. <i>Platanus orientalis</i> , L.	Чинар кавказский	Platanaceae	Кавказ, За- кавказье
406. <i>Plumbago capensis</i> Thub. (<i>Geratostigma</i>)	Плюмбаго, свин- цовка	Plumbagina- ceae	Кап.
407. <i>Pointiana Gilliesii</i> Hook.	Пуанциана шиле- зи	Cesalpinaceae	Буэнос-Ай- рес
408. <i>Populus alba</i> , L.	Тополь белый. Т. серебр.	Salicaceae	Ср. Евр., Крым, Кав- каз, Зап. Азия
409. » <i>nigra</i> v. <i>pyra- midalis</i>	Тополь горный пирамид. (осо- корь)	»	Туркестан, Гималаи
410. <i>Pritchardia filifera</i> Tenkb.	Притчардия ните- носная	Palmae	Калифорн., Мексика
411. <i>Prunus caroliniana</i> , Ait.	Лавровишня ка- ролинская	Rosaceae	С. Америка
412. » <i>Laurocerasus</i> , L.	Лавровишня	»	Закавказье
413. » » v. » узко- <i>angustifolia</i>	» лиственная	»	Садов. фор- ма
414. <i>Prunus lusitanica</i> , L.	Лавровишня пор- тугальская	»	Испания
415. » <i>Pissardii</i> Carr. (<i>P. cerasifera</i> v. <i>Pissar- tii</i> Bailey)	Вишня Писсарда	»	Персия
416. <i>Prunus serrulata</i> , Lindl.	» мелкопиль- чатая	»	Сахадин, Япония, С. Китай
417. <i>Psidium Cattleianum</i> , Ldl.	Псидиум Катлей- яна	Myrtaceae	Китай
418. <i>Pterocarya caucasica</i> , A. Mey	Орех кавказский	Juglandaceae	Закавказье
419. <i>Pueraria Thunbergiana</i> , Benth.	Пуерария	Leguminosae	Япония
420. <i>Punica Granatum</i> L.	Гранат	Punicaceae	Крым, Кав- каз, Турке- стан

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 19, 13, 10, 4, 5, 6, 1, 30, 29	> 20	I	Плод.	II	
№ 18	3	III - V	Цвет.	Натур,	
№ 18	2	II	»	»	
№ 30, 34, 17 (и дико)	25	I	Плод.	Нет	
№ 15, А, 9, 1, 3, 5, 13, 30, 20, 27	> 100	I	»	»	
№ 18, 12, 22, 20, 30, 16, 17, 32	21	II	»	II	
№ 35, 33, 10, 11	> 15	I	»	II	
№ 18, 32, 12, 15, 33, 30, 17, 16, С	∞	I	»	II	
№ 18, 13	5	I	Цвет.	II	
№ 18, 19, 35, 22, 3, 4, 30, 17, 31, 32, С	> 50	I	Плод.	I	
№ 18, 19, 33, 21, 2, 27, 29, С	25	I	»	II	
№ 18, 35	7	I	Цвет.	II	
№ 18	3	II - III	»	Натур.	
№ 30, 13	3	I	Плод.	Нет	
16 натур. пунктов	—	I	»	I	
21 натур. пункт	> 50	I	»	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
421. <i>Pyracantha angustifolia</i> , CS.	Кизильник узколистный	Romaseae	Китай
422. <i>Quercus acuta</i> , Thunb.	Дуб остролистный	Fagaceae	Япония
423. » » <i>albo-nervii</i>	Дуб белонервный	»	»
424. <i>Quercus armeniaca</i> Kotschy hebr. (peduncul. x. sesilif.)	» армянский	»	Закавказье
425. <i>Quercus castaneifolia</i> Pant.	» каштанолистный	»	Закавказье, Персия
426. <i>Quercus coccifera</i> , Linn.	Дуб колючий	»	Ю. Евр., З. Азия, С. Ам.
427. » <i>glauca</i> , Thunb.	» голубой	»	Япония
428. » » <i>v. gracilis</i> , Rehd.	» изящный голубой	»	Китай
429. <i>Quercus Ilex</i> , L.	Дуб каменный	»	Средиземноморск. обл.
430. » <i>ilicifolia</i> , Wangel.	»	»	Вост. С. Америка
431. » <i>Ilex v. crispa</i> , Bean.	»	»	Садов. форма
432. <i>Quercus Ilex</i> , v. <i>rotundifolia</i> , Rehd.	»	»	»
433. <i>Quercus crispula</i> , Bl.	»	»	Япония
434. » <i>pannonica</i> Hort (Syn. <i>Q. conferta</i> , Kit.)	»	»	Балканы, Италия
435. <i>Quercus pedunculata</i> , Ehrh.	» летний	»	Ср. Евр., Крым, Кавказ
436. <i>Quercus pedunculata</i> , v. <i>dissecta-cuculata</i> Kirchn.	» »	»	Садовая форма
437. <i>Quercus Phellos</i> . L.	» иволистный	»	—
438. » <i>rubra</i> , L.	» красный	»	С. Америка
438a. <i>Quersus glabra</i> Thunc.	Дуб блестящий	Fagaceae	Япония

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- воше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18	2	I	Плод.	Нет	
№ 18	3	I	»	II	
№ 18	1	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 33, а также дико	∞	I	Плод.	Нет	
№ 18, 22, 19	> 50	I	»	I	
№ 18	2	I	Не цвет.	Натур.	
№ 18	3	I	Плод.	II	
№ 18	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 3, 5, 30, С ¹ . 11, 17	27	I	Плод.	I	¹ Комсомольск, 19 Нагорная, 5
№ 11, 18, 5	4	I	»	II	
№ 11	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 35, 11	2	I	»	»	
№ 18	2	?	Не цвет.	»	
№ 30	1	I	Плод.	Нет	
По району дико и в парках	∞	I	»	»	
№ 18	1	I	Цвет.	Натур.	
№ 18	1	I	Плод.	II	
№ 18, 2	2	I	»	II	
№ 18	3	I	»	Натур.	См. стр. 66, № 101

Наименование растений		Семейство
Латинское	Русское	
1	2	
439. <i>Quercus serrata</i> Thunb.	Дуб красный	Fagaceae
440. » <i>sessiliflora</i> , Salish.	» зимний	»
441. <i>Quercus sessiliflora</i> . f. <i>fastigiata</i>	» пирамидальн.	»
442. <i>Quercus suber</i> , L.	» пробковый	»
443. <i>Raphiolepis japonica</i> , S. A. Z.	Рафиолепис японский	Rosaceae
444. <i>Raphiolepis</i> v. <i>ovata</i> (<i>Photinia ovata</i> hort)	Рафиолепис яйцевиднолистн.	»
445. <i>Rhamnus Alaternus</i> Linn.	Крушина	Rhamnaceae
446. <i>Rhododendron caucasicum</i> L.	Рододендрон кавказский	Ericaceae
447. <i>Rhododendron ponticum</i> , L.	Рододендрон понтийский	»
448. <i>Rhododendron Smirnowi</i> , L.	Рододендрон Смирнова	»
449. <i>Rhododendron sinense</i> , Sweet.	Рододендрон китайский	»
450. <i>Rhus aromatica</i> A.	Рус ароматный	Anacardiaceae
451. » <i>copallina</i> , L.	» копаллина	»
452. » <i>coriaria</i> , L.	Сумах	»
453. » <i>cotinus</i> , L. Syn. <i>Cotinus Coggygia</i> Seop.	» париковый, Скумпия	»
454. » <i>semialata</i> , Murr.	Рус семиалата	»
455. » <i>succedanea</i> , Thumb.	Восковое дерево	»
456. » <i>toxicodendron</i> , L.	Сумах ядовитый	»

Родина	Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
	Натурализац. пункты	Кол. экз.				
4	5	6	7	8	9	10
Япония, Ко- рея, Китай, Гималаи	№ 18	3	I	Не цвет.	Натур.	
Европа, Крым, Кав- каз, Азия	По району дико и в парках	∞	I	Плод.	Нет	
Садов. фор- ма	№ 30, 20	3	I	Цвет.	»	
Ю. Евр., Сев. Аф- рика	№ 18, 22, 32, 15, 30	8	I	Плод.	I	
Япония, Ко- рея	№ 18	5	I	»	II	
Япония	№ 18	2	I	»	I	
Ож. Европа	№ 30, 33, 16	8	I	Цвет.	Натур.	
Кавказ	№ 26	2	I	»	»	
Кавказ, За- кавказье	№ 18	5	I	»	»	
Кавказ	№ 26, 11	2	I	г	»	
Китай	№ 35	1	I	»	»	
Америка	№ 18	4	I	Не цвет.	»	
Канада, Те- хас	№ 18	3	I	Цвет.	»	
Крым, За- кавказье	№ 19, 18, 33	8	I	Плод.	Нет	
Евр., Крым, Кавказ	№ 29, 17	> 10	I	»	II	
Япония	№ 18	3	I, 3, III	Цвет.	Натур.	
Китай, Япо- ния, Гимал.	№ 2, 35, 3	5	I	Плод.	»	
Япония, Сев. Америка	№ 18, 8	> 4	I	Цвет.	Нет	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
457. <i>Rhus trichocarpa</i> , Miq.	Рус трихокарпа	Апасардия-сеае	Япония, 1 / тай
458. » <i>typhina</i> , L.	Укусное дерево	»	Сев. Ам рика
459. » <i>verniciфера</i> , DC	Лаковое дерево	»	Япония
460. <i>Rhynchospermum jasminoides</i> Lindl.	Ринхоспермум, жасмин.	Аросупасеае	Япония, 1 тай
461. <i>Robinia hispida</i> , L.	Щетинистая лже-акация	Leguminosae	С. Амери
462. » <i>neomexicana</i> , Gray	Акация ново-мексиканск.	»	»
463. <i>Robinia Pseudoacacia</i> , L.	Белая лжеакация	»	»
464. <i>Robinia viscosa</i> , Vent.	Акация клейкая	»	»
465. <i>Rosmarinus officinalis</i> , L.	Розмарин	Labiatae	Средиз морск. с
466. <i>Ruscus aculeatus</i> , L.	Иглица, царский веник	Illiciaceae	Европа Крым, Кказ. в пар дико
467. » <i>hyppophyllum</i> , L.	Бабья ягода	»	Закавказ
468. <i>Ruscus racemosus</i> , L.	Александрийский лавр	»	Закавказ Персия, рия
469. (<i>Rosa R. canina</i> и. <i>R. polyantha</i> и др.)	Розы	Rosaceae	—
470. <i>Sabal Adansonii</i> Snerms.	Сабаль Адансона	Palmeae	Кароли
471. » <i>Palmetto</i> , R. A. Sch.	» Пальметто	»	Флорид
472. <i>Salix babylonica</i> , L.	Ива вавилонская	Salicaceae	Закавказ Туркест
473. » <i>elegantissima</i> K. Koch.	» изящная	»	Япони:

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18	3	1, 3, II	Не цвет.	Натур.	
№ 19, С ¹	5	I	Плод.	II	¹ Нов. Сочи, в од- ной из дач, боль- шее дерево
№ 18, 2, 3, 16	> 15	I	»	I	
№ 18, 12, 33, 32, 31, С ² , 16, А ³ , 27	14	I	»	I	² Ольгинский ту- пик, 2 ³ Дом Кукаш
№ 18, 32, 17 ⁴	> 10	I	»	II	⁴ ЦКПрос
№ 18	3	I	»	II	
В 19 натур. пунк- тах	∞	I	»	Нет	
№ 13, С ⁵ , 30	4	I	»	Натур.	⁵ По шоссе около Московск. ул.
№ 18, 21, 16, 20, 29, 17 ⁶	> 30	I	Цвет.	II	⁶ Дом Горина
—	—	I	Плод.	Нет	
№ 18, 35	3	I	Цвет.	»	
№ 18, 12, 22	4	I	Плод.	II	
По всему району	∞	I	Цвет.	I	Имеется до 120 культурных сор- тов
№ 18	3	I	»	II	
№ 30, 16 ⁷	2	II	Не цвет.	Натур.	⁷ Д. б. Подгур- ского
23 натур. пункта	> 50	I	Цвет.	I	
№ 18, 35	3	I	»	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
474. <i>Sapindus saponaria</i> , L.	Мыльное дерево	Sapindaceae	Китай
475. <i>Schinus Molle</i> , Lin.	Перечное »	Anacardiaceae	Перу
476. <i>Serissa foetida</i> Comm. ess.	Серриса фётида	Rubiaceae	Китай, Япония
477. <i>Smilax excelsa</i> , L.	Павой	Liliaceae	Закавказье
478. <i>Sophora glauca</i> , DC.	Софора	Leguminosae	?
479. » <i>japonica</i> , L.	» японская	»	Япония, Китай
480. » » <i>f. pendula hort.</i>	» плакучая	»	Сад. форма
481. <i>Sorbus torminalis</i> , Crantz.	Берека глоговина	Romaceae (Rosaceae)	Европа
482. <i>Sasa paniculata</i> Mak.	Саса паникулята	Gramineae	Япония
483. » <i>tesselata</i> , Max.	» тесселята	»	»
484. <i>Spartium junceum</i> , L.	Дрок	Leguminosae	Юж. Европа
485. <i>Spiraea albiflora</i> , Miq.	Спирея белоцветная	Rosaceae	Япония
486. » » <i>x Sp. japonica</i>	Спирея	»	Гибрид
487. <i>Spiraea Billiardieri</i> Zab.	» Биллардиера	»	»
488. » <i>callosa</i> , Thbg.	Спирея каллоза	»	Китай
489. » <i>cantonensis</i> , Laur.	» кантонензис	»	Япония, Китай
490. <i>Spiraea chinensis</i> , Maxim.	Спирея китайская	»	Китай
491. <i>Spiraea Douglasii</i> , How.	» Дугласа	»	С. Америка
492. » <i>hypericifolia</i> L.	»	»	Ю. Евр. СССР, Крым Кавказ, Туркестан, Ю. Сибирь
493. <i>Spiraea japonica</i> , L.	» японская	»	Япония
494. » » <i>Bumalda hort.</i>	» Бумальда	»	Сад. форма

Местонахождение в районе		Моро- зоустой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 11	6	I	Не цвет.	Натур.	
№ 18	3	III	»	Нет	
№ 18	6	I	Цвет.	II	
Дико в парках	∞	I	Плод.	Нет	
№ 18, 15, 2	3	I, 3, III	Не цвет.	Натур.	
№ 18, 33, 2, 5, 13, 29	8	I	Плод.	II	
№ 18, 17 ¹	4	I	Не цвет.	II	¹ Дом отд. ЦК Проса
№ 9, 19, 33 (и дико)	4	I	Плод.	Нет	
№ 18	∞	I	—	»	
№ 18	∞	I	—	»	
№ 19, 30, 20	∞	I	Плод.	II	
№ 13, 14, 15, 11, 12	5	I	Цвет.	I	
№ 13, 10	3	I	»	II	
№ 18, 35, 13	> 15	I	»	II	
№ 18, 35	> 15	I	»	II	
№ 35	> 10	I	»	II	
№ 18, 35	8	I	»	II	
№ 17, 18, С ¹ , 13	14	I	»	I	¹ Д. Б. Новичковой
№ 35	3	I	»	II	
№ 18, 35, 13, 15, 11, 12, 14, 30	> 25	I	»	I	
№ 35	10	I	»	II	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
495. <i>Spiraea latifolia</i> , Borkh.	Спирея широко- листная	Rosaceae	С. Америка
496. » <i>Lindleyana</i> , Wall.	Спирея Линдлея	»	Гималаи
497. <i>Spiraea prunifolia</i> , S. et Z.	Таволга сливо- листная	»	Китай
498. » <i>salicifolia</i> , L. (Syn. <i>S. Sibirica</i> , Rgl.	Таволга иволист- ная	»	Зап. Евр., СССР, Си- бирь, Амурск. и Уссур. обл.
499. <i>Spiraea sorbifolia</i> (Syn. <i>Sorbaria sorbifolia</i> , A. Br.)	Таволга рябино- листная	»	Сибирь, Ус- сурийск. обл.
500. <i>Spiraea Thunbergi</i> , S. et Z.	Таволга Тунберга	»	Китай
501. <i>Staphylea colchica</i> , Stw.	Клекачка мин- грельская	Staphyleaceae	Закавказье
502. » <i>pinnata</i> , L.	Клекачка обык- новенная	»	Европа
503. <i>Stauntonia latifolia</i> , Wall (Syn. <i>Holboellia latifo- lia</i> , Wall).	Стаунтония	Lardicebala- ceae	Гималаи
504. <i>Stephanandra Tanakae</i> Fr. et savot.	Стефанандра Та- нака	Spiraeaceae	Япония
505. <i>Sterculia platanifolia</i> , L. (Syn. <i>Firmania platifo- lia</i> , R. Br.)	Стеркулия платан- нолист.	Sterculiaceae	Китай, Япо- ния
506. <i>Stranwaesia glaucescens</i> , Lindl. (Syn. <i>S. nussia</i> , Decne).	Странвезия	Rosaceae	Гималаи
507. <i>Stylingia sebifera</i> , Michx.	Стиллингия	Euphorbia- ceae	Китай
508. <i>Styrax japonicum</i> , S. et Z.	Стиракс япон- ский	Styracaceae	Корея, Ки- тай
509. <i>Syringa vulgaris</i> , L.	Сирень обыкно- вен.	Oleaceae	Балк. полу- остр., Вен- грия
510. » <i>persica</i> L.	Сирень персид- ская	»	М. Азия

Местонахождение в районе		Много- устой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18	2	I	Цвет.	II	
№ 35	3	I	»	II	
№ 18	2	I	»	Нет	
№ 35, 18	2	I	»	»	
№ 18	2	I	»	»	
№ 17, 16, 18, С ¹	5	I	»	I	¹ Нагорная, 5
№ 20, 35, 13, 1	> 20	I	Плод.	Нет	
№ 35	3	I	»	»	
№ 18, С	2	I	Цвет.	II - I	
№ 18, С ¹	3	I	»	II	¹ Д. Б. Красавина Комсомольск., 11.
23 натур. пункта	> 100	I	Плод.	I	
№ 18	2	I, 3, III	»	II	
№ 11, 18	5	II—III	Цвет.	Натур.	
№ 18	3	I	Плод.	»	
22 натур. пункта	> 100	I	»	II	
№ 33	4	I	Цвет.	Натур.	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
511. <i>Tamarix tetrandra</i> , Pall.	Гребенчук четырехтычинковый	Tamaricaceae	Крым, Греция, Черном. окр.
512. <i>Tecoma grandiflora</i> , Loise.	Текома крупноцветная	Bignoniaceae	Китай
513. <i>Tecoma radicans</i> , Juss.	Текома укореняющаяся	»	С. Америка
514. <i>Thea sinensis</i> , L.	Чайное дерево	Camellaceae	Китай
515. <i>Tilia caucasica</i> , Rupr.	Липа кавказская	Tiliaceae	Крым, Кавказ
516. » <i>cordata</i> , Mill.	» мелколистная	»	Европа, Крым, Кавказ
517. » <i>euchlora</i> , K. Koch.	Липа крымская	»	Крым
518. » <i>grandiflora</i> , Bhrh.	» крупнолистная	»	Ю.-з. часть Евр. СССР, Крым, Кавказ
519. » <i>vulgaris</i> Heyne Mill.	Липа голландская	»	Европа, Сибирь
520. <i>Tristania nerifolia</i> , R. Br.	Тристания нерей-фолия	Myrtaceae	Нов. Зеландия
521. <i>Trachycarpus excelsa</i> , Wendl.	Трахикарпус	Palmae	Япония
522. <i>Trachycarpus Fortunei</i> , Wendl.	» фортуна	»	Китай
523. <i>Ulmus campestris</i> , L.	Карзгач, берест, полевой ильм.	Ulmaceae	Европа, Туркестан, Крым, Кавказ, Амурск обл.
524. » <i>effusa</i> , Willd.	Вяз	»	Европа
525. » » <i>f. variegata</i>	» пестролистный	»	Садовая форма
526. <i>Ulmus montana</i> , Sm.	Ильм	»	Европа, Африка, Азии

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол. экз.				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 9, 15, 29, 31, С	8	I	Плод.	II	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18	5	I	Плод.	I	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18, 33, 22, 9, 8, 17, 16, 31, 32, С	50	I	Плод.	I	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
Хосга					
№ 18, 35, 12	10	I	Цвет.	Натур.	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 10, 18, 22, 20, 38, 27, 25, 31	12	I	Плод.	II	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 10	5	I	Цвет.	Натур.	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 35, 10	4	I	Плод.	II	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 10	4	I	Цвет.	Натур.	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 10	6	I	Плод.	II	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18	2	II-IV	Цвет.	Натур.	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
По всему району	∞	I	Плод.	I	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18, 19, 35, 11	5	I	Цвет.	Натур.	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18, 38, 11 (и дико)	4	I	Плод.	Нет	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18, 75	4	I	Плод.	II	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 13	2	I	Цвет.	II	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11
№ 18, 13	3	I	Плод.	Нет	Д. 61 Крадавиле Комсомольск., 11

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
527. <i>Uraria lagopus</i> , DC.	Урария лагопус	Leguminosae	Индия
528. <i>Veronica Lindleyana</i> Paxt. v. <i>Andersoni</i>	Вероника Андерсона	Scrophulariaceae	Новая Зеландия
529. <i>Veronica elliptica</i> , Farst.	Вероника эллиптическая	»	»
530. » <i>Traversii</i> , Hook.	Вероника Траверси	»	»
531. <i>Viburnum glabratum</i> , H. B. K.	Калина боливийская	Caprifoliaceae	Боливия
532. <i>Viburnum japonicum</i> , Spreng.	Калина японская	»	Япония
533. <i>Viburnum Lantana</i> , L.	Гордовина	»	Европа, Крым, Кавказ
534. » <i>Lentago</i> , L.	» канадская	»	С. Америка
535. » <i>macrocephalum</i> , Fort.	Гордовина крепноголовая	»	Китай
536. <i>Viburnum odoratissimum</i> , Keer.	Калина душистая	»	»
537. <i>Viburnum Opulus</i> f. <i>sterile</i> , D. C.	» махровая (буль-де-неж)	»	Европа
538. <i>Viburnum Sandankwa</i> , Hauss.	Калина Санданква	»	Япония
539. <i>Viburnum suspensum</i> (Syn. <i>V. Sandakwa</i> Hagi- skari)	» висячая	»	—
540. <i>Viburnum Tinus</i> , L.	» вечно-зеленая	»	Ю. Европа
541. <i>Vitex Agnus-Castus</i> , L.	Прутняк	Verbenaceae	Крым, За- кавказье
542. <i>Weigelia amabilis</i> hort.	Вейгелия	Caprifoliaceae	Китай, Ко- рея
543. » <i>rosea</i> , Lindl.	» розовая	»	»
544. <i>Jucca aloifolia</i> , L.	Юкка алоэво-листная	Liliaceae	Мексика

Местонахождение в районе		Моро- зостой- чивость	Плодо- ноше- ние	Значе- ние для района	Примечание
Натурализац. пункты	Кол экз				
5	6	7	8	9	10
№ 18, 35	10	I	Цвет.	Натур.	
№ 18	2	I—II	»	»	
№ 18	2	I—II			
№ 18	4	I			
№ 35, 18	4	I	Плод.		
№ 35	1	I, 3, III	Цвет.		
№ 18	1	I	Плод.	II	
№ 35	2	I		II	
№ 18, 35	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 18, 35, 16	6	I, 3, II		»	
№ 13, 17, C	> 10	I		II	
№ 18, C ¹	3	I—II	Плод.	II	¹ Моск. д. Годзи, д. б. Мамонтова
№ 18	3	I	Цвет.	Натур.	
19 натур. пунктов	∞	I	Плод.		
№ 35, 13 (также ди. о)	10	I	»	II	
№ 18, 35	4	I	Цвет.	II	
№ 18, 35	3	I	»	II	
№ 18, 12, 33, 22, 20, 31, 32, 16, 17, 26, 35	> 30	I	Плод.	I	

Наименование растений		Семейство	Родина
Латинское	Русское		
1	2	3	4
545. <i>Jucca angustifolia</i> , Putsh.	Юкка сизая узко- листная	Liliaceae	Америка
546. » <i>Desmetiana</i> , Bak.	Юкка		Мексика
547. » <i>filamentosa</i> , L.	» нитчатая		С. Америка
548. » <i>flexilis</i> , Carr.	» гибкая		Мексика
549. » <i>gloriosa</i> , L.	» великолеп- ная		С. Америка
550. » <i>recurvata</i> Hort.	Юкка рекурвата	Rutaceae	»
551. » <i>Treculeana</i> , Carr.	» Трекулеана		Мексика
552. <i>Zanthoxylum fraxineum</i> Willd.	Цантоксилум		С. Америка
553. <i>Zanthoxylum nitidum</i> , Bunge.			Китай
554. <i>Zelkova crenata</i> , Spach.	Дзельква город- чатая	Ulmaceae	Кавказ

	Пункт	Мирно-популярность	Плодоношение	Значение для района	Примечание
	7	8	9	10	
№ 14	2	I	Цвет.	Натур.	
№ 18	1	I	Не цвет.	»	
№ 18, 12, 33, 11, 10, 20, 16, 17, 35, 19	> 35	I	Плод.	I	
№ 18, 12	—	3	Не цвет.	Натур.	
14 натуральных пунктов	> 50	I	Цвет.	I	
№ 18	2	I	»	Натур.	
№ 18, 12, 21	6	I	Не цвет.	»	
№ 18, 17 ¹ , X ²	9	I	Плод.	Нет	¹ Д. отд. ЦКПроса ² Д. б. Новицкого
№ 18	1	I	»	»	
№ 19	2	I	»	Натур.	

Напечатано СЕЛЬХОЗГИЗОМ по
заказу Академии Коммунального
хозяйства при СНК РСФСР

Редактор С. Г а т о в с к и й
Технич. редактор Т. С о к о л о в а
и А. Щ е р б а к о в

Инд. 90 СХГИЗ 4765

Сдано в производство 4/VII. 1934 г.

Подписано в печать 23/X 1934 г.

Объем 7½ печ. л.+12 полос вкладок

Знаков в печ. листе 60.000

Формат бумаги 82X110/32

Уполн. Главлита Б—40264 Тираж 2000

18-я тип. треста «Полиграфкнига»
Москва, Варгунихина гора, 8.